


MAÏS

Diabrotica

Malgré des températures encore élevées, favorables aux captures, le nombre de captures baisse sensiblement cette semaine. Au total, nous approchons des 4 000 insectes capturés sur 53 des 136 pièges. La chrysomèle est majoritairement capturée dans une zone qui s'étend du Ried sud au sud de la Hardt, en passant par la Plaine de l'Ill. La première capture de l'année dans le Kochersberg a été confirmée par une seconde capture sur un autre site de ce secteur.

Le dernier relevé aura lieu la semaine prochaine et permettra de faire un bilan des captures de l'année.



Captures cumulées de diabrotica en Alsace depuis le 15 juillet

Attention néanmoins, la carte ci-dessus représente des cumuls par commune, sachant que dans les communes les plus infestées, il y a plusieurs pièges.

COLZA

Limaces

Les limaces sont présentes dans les parcelles et sont susceptibles d'attaquer les colzas en

cours de levée dès lors que les conditions d'humidité du sol en surface sont favorables. Malgré les conditions sèches que nous connaissons actuellement et les préparations de sols qui ont pu être défavorables aux populations en place, il convient de rester vigilant notamment si des averses sont annoncées ou si un couvert maintient l'humidité au sol.

Installation des cuvettes jaunes

Le réseau d'observation se met en place au fur et à mesure des semis. Beaucoup de parcelles ont été semées seulement la semaine dernière quand des prévisions de pluies ont été annoncées pour le week-end.

Avant la levée de la culture puis en complément de l'observation des plantes, les pièges nous informent sur l'arrivée des ravageurs et leur activité. Il convient de mettre en place les cuvettes jaunes dès l'implantation de la culture.

Les cuvettes jaunes se placent au niveau de la végétation, sauf pour les grosses

MAÏS
Chrysomèle
COLZA
Limaces
Cuvettes jaunes

altises (altises d'hiver) où la cuvette doit être enterrée.

Piège enterré : Altise d'hiver

bord supérieur à 1 à 2 cm au dessus du sol.



Piège sur végétation : Tous les autres insectes



Source Terres Inovia

Quelques conseils d'usage pour que les pièges soient attractifs :

- Positionner le piège dans le champ en tenant compte des vents dominants et de la proximité d'une ancienne parcelle en colza
- Remplir la cuvette avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de mouillant de type liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un bidon qui reste dans la parcelle pour mettre à niveau la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation. Si nécessaire, déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive. Si la couleur jaune est «passée», changer de cuvette.
- Relever la cuvette chaque semaine :

filtrer les insectes et éventuellement les laisser sécher pour faciliter leur reconnaissance, remplacer l'eau régulièrement, repositionner la cuvette en fonction de la hauteur de végétation.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.