

COLZA

Stades du colza

Le réseau se remet progressivement en place. Seulement 15 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine si bien que l'aperçu de la situation n'est que partiel.

Le stade C1 qui correspond à la reprise de la végétation est observé dans toutes les situations. Il n'y a pour le moment aucune élongation de tige observée.

Charançons de la tige : sachez distinguer les 2 espèces



Charançon de la tige du colza



Charançon de la tige du chou

Source : Laurent Jung – Terres Inovia

Il est important de bien différencier le charançon de la tige du chou qui accompagne ou précède l'arrivée du charançon de la tige du colza dont la nuisibilité est faible.

Il est nécessaire de faire sécher les insectes puis d'observer avec une loupe et une bonne lumière. Le charançon de la tige du colza a l'extrémité des pattes noires. Le charançon de la tige du chou, plus petit, a l'extrémité des pattes rousses et une tâche blanchâtre dorsale entre le thorax et l'abdomen.

Situation à ce jour :

Quelques individus ont été capturés très ponctuellement à la faveur des belles journées de la semaine passée. Il n'y a pas de risque pour le moment, d'autant que le stade de sensibilité n'est pas atteint.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

COLZA

Premières captures de charançons de la tige, mais le risque reste faible à nul