

Houblon

Météo et stades

Les températures douces de ces derniers jours sont favorables au réveil et à la croissance du houblon. Les stades observés varient de quelques pousses visibles pour les parcelles taillées récemment à près de 40-50 cm pour les parcelles les plus en avance. Dans les parcelles les plus développées, l'ébourssage peut démarrer.

L'absence de précipitations depuis une quinzaine de jours, associée à la douceur et parfois à un vent sec n'est pas encore préjudiciable pour les houblons « adultes », mais pourrait devenir problématique pour les parcelles qui viennent d'être plantées. Et ce d'autant plus qu'aucune pluie n'est annoncée avant le milieu de la semaine prochaine.

Mildiou

Des attaques de mildiou primaire sont observées sur plus de la moitié des parcelles du réseau de suivi, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 55 % des pieds touchés. Pour l'instant, l'intensité des attaques est plutôt faible, avec moins d'une

pousse spiciforme par pied en moyenne. Ces symptômes ne sont pas surprenants vu la forte pression mildiou en 2016.



Pousse spiciforme (pousse jaunâtre au centre) – photo Comptoir Agricole

La plupart des parcelles ont été protégées, mais la sécheresse (en surface) limite certainement la pénétration et l'action du produit.

Othiorrhynque de la livèche

Les premiers dégâts ont été observés dès la semaine dernière, mais ont bien progressé depuis, les températures actuelles étant favorables à l'activité de ce ravageur. Dans les parcelles historiquement infestées, on peut observer jusqu'à un tiers des plantes

présentant au moins une morsure.

SOMMAIRE

- ✓ Météo et stades
- ✓ Mildiou
- ✓ Othiorrhynques