

Colza

La végétation se réveille doucement. Dans les parcelles les plus précoces, de jeunes feuilles sont visibles au cœur des plantes. Le décollement de la tige, identifiable par un étranglement vert clair à la base des pétioles, n'est pas encore observé dans les parcelles.



Un bilan des poids verts à la sortie de l'hiver sera réalisé dans un prochain bulletin en fonction des observations transmises.

Ravageurs

Le retour des conditions clémentes doit inciter à **remettre en place les cuvettes jaunes pour détecter l'arrivée des charançons de la tige** dans les parcelles. Rappelons que la période de sensibilité du colza à ce ravageur débute avec la montaison (à partir du stade C2 mentionné plus haut). Autrement dit, même si les premiers insectes sont capturés, le risque est nul tant qu'il n'y a pas d'entre-nœuds visibles.

Les premières observations transmises cette semaine ne font pas état de dégâts de larves d'altises ou de charançons du bourgeon terminal : 0 à 2% de cœurs détruits. Un bilan des attaques des ravageurs d'automne sera dressé lorsqu'un plus grand nombre

d'observations sera remonté. Noter que ce bilan sanitaire peut se faire en même temps que les biomasses sortie hiver. Profiter de ces prélèvements destructifs pour vérifier la présence de larves dans les cœurs, en coupant en 4 le cœur des plantes.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

COLZA

Reprise lente de la
végétation
Remettez les
cuvettes en place