

COLZA

La levée des colzas se généralise : 80% des parcelles du réseau d'observation ont atteint ou dépassé le stade cotylédons. La majorité des parcelles est au stade 1 à 2 feuilles étalées. Les plus avancées sont au stade 3 feuilles. Toutes les parcelles de colza sont donc au stade sensible à l'égard des attaques de limaces et d'altises. La pression exercée par les ravageurs est jusqu'alors très faible mais la vigilance doit rester de mise jusqu'au stade 3-4 feuilles.

Limaces

Aucun dégât significatif n'est signalé. Rester vigilant pour détecter les attaques précoces qui sont généralement les plus préjudiciables car elles mettent en péril le peuplement de la culture. Les situations à risque sont les parcelles avec des antécédents d'attaque, les préparations motteuses ou avec présence de débris végétaux en surface, lorsque les conditions climatiques sont favorables (pluies régulières, température douce, absence de

vent).

Altise

L'activité des altises est restée très limitée cette semaine. Aucune capture n'est enregistrée et les dégâts sur plantes sont minimes. Le seuil de nuisibilité fixé à 8 pieds sur 10 portant des morsures, sans dépasser ¼ de la surface foliaire détruite, n'est jamais atteint.



La remontée des températures au-dessus de 20°C après la période de rafraîchissement que nous connaissons devrait être favorable à l'activité des altises d'hiver (grosse altise). Il convient donc de rester vigilant.

Les premiers cas de résistances d'altises

d'hiver à certains produits ont été décelés en France la campagne dernière. Pour une gestion durable du ravageur, la prise en compte à l'échelle de la parcelle de la période de risque et du seuil de nuisibilité est capitale avant toute décision.

Dès que les premières morsures sont repérées, la surveillance de la parcelle doit être renforcée jusqu'au stade 3-4 feuilles. Les dégâts de petites altises, le plus souvent en bordure, peuvent s'accumuler rapidement et le seuil de nuisibilité peut être dépassé en quelques jours. Observer en priorité les bordures de parcelle, notamment à proximité d'un champ de colza la campagne précédente. La destruction des repousses de colza à proximité peut entraîner une migration des populations d'altise vers la nouvelle culture en place.

Rappel : Pensez à installer la cuvette jaune dès l'implantation de la culture (voir BSV n°27 du 2 septembre 2015)

COLZA

Limaces

Altises