

Horticulture-Pépinière - LORRAINE

BULLETIN N°15 – EDITION DU 3 SEPTEMBRE 2015

CHRYSANTHEMES et pucerons : peu présents

Quelques rares colonies de pucerons sont signalées dans le cœur des jeunes feuilles de chrysanthèmes

CHRYSANTHEMES et thrips : peu signalés

La situation n'évolue guère mais avec le retour des températures plus douces, il faut rester très vigilant et suivre l'évolution des populations sur les panneaux englués.

CHRYSANTHEMES et chenilles : Les chenilles défoliatrices ont fait leur apparition

Très polyphages et voraces, ces chenilles se sont installées dans les cultures de chrysanthèmes mais également dans le feuillage des cinéraires maritimes

Dégâts foliaires sur cinéraire maritime (Photo AREXHOR G.E.)



Trou dans une feuille de chrysanthème dû à des chenilles (photo AREXHOR G.E.)

POINSETTIAS : quelques aleurodes et piqûres de thrips observés sur le feuillage.

Quelques individus d'aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les panneaux englués mais sans symptômes sur les plantes. Un observateur signale également la présence de thrips.

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

BULLETIN N°15– EDITION DU 3 SEPTEMBRE 2015

VU DANS LES SERRES : présence de punaises (Lygus) dans les chrysanthèmes
(Photos ADHP)



Punaise sur feuille de chrysanthème

Pour se nourrir, les larves et les adultes piquent les cellules provoquant des nécroses apicales ou des feuilles gauffrées, rugueuses et sans forme.



DEPERISSEMENT RACINAIRE SUR CHRYSANTHEME :

Suite à des arrosages répétés en goutte à goutte, on observe sur variétés sensibles un dépérissement partiel de la partie aérienne de la plante. Le système racinaire est également nécrosé.

EN PEPINIERE :

MARSSONINA rosae sur feuille de rosier

(photo AREXHOR G.E.)



CERCOSPORIOSE sur cornouillier (photo AREXHOR G.E) : l'apparition de cette maladie cryptogamique est souvent liée à un stress hydrique

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

BULLETIN N°15– EDITION DU 3 SEPTEMBRE 2015

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Selon l'évolution des conditions climatiques des prochains jours surveiller les populations de thrips dans les chrysanthèmes.

| Couple plante/ravageur | | Niveau de risque |
|-------------------------|--------------|------------------|
| Ravageur | plante | |
| Acariens | Chrysanthème | |
| Chenilles défoliatrices | Chrysanthème | A SURVEILLER |
| Pucerons | Chrysanthème | A SURVEILLER |
| Rouille blanche | Chrysanthème | |
| Thrips | Chrysanthème | A SURVEILLER |
| Fusariose | Chrysanthème | |
| Pucerons | Cyclamen | |
| Thrips | Cyclamen | |
| Sciarides | Cyclamen | |
| Aleurodes | Poinsettia | |
| Thrips | Poinsettias | |

| Légende | |
|---------------------------|---|
| Aucun risque |  |
| Risque moyen à surveiller |  |
| Risque important |  |

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02