



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°1 – 18 février 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

COLZA

Stade : Reprise de végétation. Début montaison dans un quart des parcelles

Charançon de la tige du colza : Premières captures significatives enregistrées uniquement à Reiningue (68). Le vol n'a pas encore débuté à l'échelle du territoire alsacien.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

13 Colza.



- Prévision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23	MARDI 24	MERCREDI 25
3° / 7°	3° / 7°	5° / 13°	8° / 13°	8° / 14°	6° / 14°	7° / 13°
↙ 15 km/h	↙ 20 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 20 km/h	↙ 10 km/h 45 km/h	↙ 15 km/h	↙ 15 km/h 45 km/h

(Source : Météo France, 17/02/2026 à 15h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23	MARDI 24	MERCREDI 25
2° / 9°	5° / 10°	5° / 13°	8° / 13°	7° / 15°	6° / 15°	7° / 14°
↙ 15 km/h	↙ 20 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h	↗ 15 km/h	↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h

(Source : Météo France, 17/02/2026 à 15h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Altkirch :

JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23	MARDI 24	MERCREDI 25
3° / 10°	5° / 9°	6° / 13°	7° / 14°	9° / 15°	5° / 17°	5° / 13°
↗ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 25 km/h 55 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h	↙ 25 km/h 60 km/h


(Source : Météo France, 17/02/2026 à 15h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Stades phénologiques

La reprise de végétation est effective pour 85 % des parcelles du réseau. La montaison est engagée dans 23 % des situations (stade C2 - BBCH31 – entre-nœuds visibles). Des dégâts de gel sont signalés dans une parcelle à REININGUE (68). Des excès d'eau, pouvant pénaliser les cultures, sont signalés à OERMINGEN (67), WEITBRUCH (67) et BALSCHWILLER (68).

Répartition des stades du colza




Localisation des parcelles observées



(Terres Inovia)

Les pièges sur végétation doivent être remis en place dans les parcelles de colza pour être en mesure de capturer, le moment venu, les premiers charançons qui se porteront sur les cultures.



Placer la cuvette à au moins 10 mètres au-delà de la bordure de la parcelle et si possible à proximité d'un ancien champ de colza de l'année précédente.

Remplir les cuvettes avec environ 1 litre d'eau additionnée de quelques gouttes de mouillant (liquide vaisselle sans parfum).

Le fond de la cuvette suit le niveau supérieur de la végétation.

Réaliser 1 relevé au moins 1 fois par semaine.

Eviter le piétinement qui modifie le contexte de végétation autour du piège. Si nécessaire, déplacer la cuvette.

Nettoyer régulièrement la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive.

2 Charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)

Le charançon de la tige du colza est un gros charançon de couleur gris cendré avec le bout des pattes noir. Les piqûres de ponte du charançon de la tige du colza entraînent une désorganisation cellulaire qui déforme la tige, voire engendre des éclatements. La nuisibilité est d'autant plus importante que les printemps sont secs.

L'arrivée des charançons de la tige du colza est souvent concomitante avec le vol de **charançons de la tige du chou**. Cet autre charançon, avec le bout de pattes roux et une tache blanchâtre dorsale entre le thorax et l'abdomen, est historiquement considéré comme peu nuisible dans des conditions normales de culture. Les colzas peuvent supporter sans dommage un grand nombre de larves de charançons de la tige du chou dans la moelle de la tige. Toutefois, la nuisibilité des larves de charançon de la tige du chou est difficile à appréhender et interroge ces dernières années. Les fortes infestations peuvent impacter les plus petits colzas avec un faible diamètre de tige et les nombreuses piqûres à l'aisselle des feuilles peuvent favoriser l'installation des maladies responsables des pieds secs en fin de cycle. Des références sont en cours d'acquisition dans les conditions actuelles de culture. Aujourd'hui, le risque est géré indirectement par la protection qui vise le charançon de la tige du colza.

Charançon de la tige du CHOU
Ceutorhynchus quadridens



Charançon de la tige du COLZA
Ceutorhynchus napi Gyll.



photos Terres Inovia

a. Observations

Les premiers charançons de la tige sont observés sur le réseau au cours des 10 derniers jours (conditions favorables au vol les 7 et 8 février). Ce sont principalement des charançons de la tige du chou qui sont capturés. Des captures de charançons de la tige du colza (13 individus cumulés) sont observés uniquement sur la parcelle de REININGUE (68).

Le vol n'a pas débuté à l'échelle du territoire alsacien. Les premières captures localisées incitent à surveiller les parcelles abritées du vent à proximité de Mulhouse et à remettre en place les pièges sur végétation si ce n'est pas déjà fait.

b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque. On considère qu'il y a un risque dès lors que sa présence est relevée sur la parcelle et après un délai de 8 à 10 jours (nécessaire à la maturation des femelles) du stade C2 à E (boutons séparés) inclus.

c. Analyse de risque

Le vol n'a pas encore débuté sur l'ensemble du territoire alsacien. Les conditions météorologiques perturbées annoncées ces prochains jours ne devraient pas être favorables au déclenchement du vol ou bien encore à l'activité en parcelle des premiers individus capturés. Le risque est faible pour l'instant, d'autant plus qu'une majorité de parcelles n'a pas encore atteint ou dépassé le stade C2 (entre-nœuds visibles).

Néanmoins, en raison des captures précoces enregistrées à Reiningue et de l'avancement des stades, les parcelles abritées du vent à proximité de Mulhouse sont à surveiller.





Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Cristal Union et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr



« Action de la Stratégie Écophyto 2030 pilotée par les ministères chargés de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. »

