

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°20 – 01 Juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

Une nouvelle période caniculaire annoncée.

MAÏS

Stade : De 11 feuilles à floraison mâle. Des maïs qui souffrent en conditions sèche

Pyrale : Le pic de vol de la monovoltine est atteint.

Chrysomèle des racines du maïs : Un début vol marqué en secteur plaine irriguée



Parcelles observées cette semaine :

18 Maïs



Une météo plus fraîche et humide après la vague de chaleur de la semaine dernière

- Prévvision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
13° / 29°	15° / 28°	12° / 29°	14° / 31°	16° / 29°	16° / 28°	16° / 30°
➤ 20 km/h	◀ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 20 km/h 40 km/h	▲ 15 km/h 40 km/h	▲ 15 km/h 40 km/h	▼ 15 km/h

(Source : Météo France, 30/06/2026 à 16h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévvision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
16° / 28°	17° / 27°	14° / 30°	16° / 32°	19° / 32°	18° / 33°	19° / 32°
▼ 15 km/h	▲ 15 km/h	▼ 5 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	▼ 10 km/h

(Source : Météo France, 30/06/2026 à 16h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévvision météo à 7 jours pour Altkirch :



JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
13° / 28°	16° / 26°	13° / 29°	15° / 30°	17° / 30°	16° / 30°	16° / 30°
▼ 15 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	▲ 15 km/h	▼ 10 km/h	▼ 10 km/h	➤ 15 km/h

(Source : Météo France, 30/06/2026 à 16h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Stades phénologiques

18 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine, réparties sur l'ensemble du territoire. Les stades ont rapidement évolué cette semaine dans les parcelles irriguées. Malgré les quelques pluies de la fin de semaine dernière, les maïs non irrigués souffrent fortement notamment en sol léger.




Attention ! Échelle communément utilisée par ARVALIS : le stade foliaire est déterminé par le comptage de toutes les feuilles visibles. Toute feuille ou portion de limbe que l'on aperçoit lorsque l'on place les yeux à la hauteur du cornet et que l'on regarde horizontalement doit être compté.

Concordance des stades avec l'échelle BBCH : 8-9 feuilles (BBCH 17-18), 11-12 feuilles (BBCH 20-21), 13-14 feuilles (BBCH 22-23), 15-16 feuilles (BBCH 24-25), 17-18 feuilles (BBCH 26-27), Floraison mâle (BBCH 50-59)

2 Pyrales

a. Observations

Le pic de vol est en cours sur la majeure partie du territoire. 13 pièges sur 14 capturent des papillons de pyrale. Le pic de vol est bien identifié dans les secteurs de la plaine centre Alsace et le nord du Bas-Rhin. Les piégeages dans le Sundgau sont plus limités mais le vol se poursuit, le pic devrait avoir lieu vers la fin de semaine.



Aucune ponte observée dans le réseau pour l'instant.



Les fortes températures et le manque d'humidité ne semblent pas perturber le vol des papillons. Cependant la nouvelle période caniculaire annoncée pour la semaine prochaine devrait diminuer la viabilité des pontes.

b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à priori pour ce ravageur.

c. Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à partir des observations actuelles pour la lutte contre la pyrale. L'analyse du risque se base sur l'infestation larvaire à l'automne précédent qui était plutôt faible sur l'ensemble du territoire. Les conditions climatiques annoncées pour la semaine prochaine n'est pas favorable à la réussite des pontes. Le risque est donc plutôt faible pour l'instant.



d. Gestion alternative du risque



Il existe des solutions de biocontrôle pour protéger les maïs contre la pyrale. La liste est disponible sur ce lien : [Liste des produits de biocontrôle | Ecophytopic.](#)

Les trichogrammes (*Trichogramma brassicae*) peuvent être utilisés pour protéger les parcelles de maïs. Ces petits hyménoptères spécifiques de la pyrale déposent leurs œufs dans ceux du ravageur. Les larves qui se développent se nourrissent des œufs de pyrale, détruisant ainsi les populations de ravageurs. La pose des trichogrammes devrait s'effectuer au cours de cette semaine pour les secteurs précoces.

Des méthodes alternatives existent également, pour plus d'informations, consulter la fiche [pyrale du maïs](#).

3 Chrysomèles des racines du maïs


a. Observations

Le vol a déjà bien commencé dans les secteurs précoces (Hardt et sud du Bas Rhin) depuis la semaine dernière. Dans ces secteurs à forte pression historique, les premiers dégâts sur racine sont aussi observés avec ponctuellement de la verse précoce dans certaines parcelles.


Les premiers résultats de piégeage (35 sites pour l'instant) montrent d'importantes captures dans la plaine irriguée.



Verse précoce – Centre Alsace



Chrysomèle adulte sur feuille – Fessenheim le haut



En vert : 0 à 10 Chrysomèles
En orange : 10 à 100 de chrysomèles
En rouge : + de 100 chrysomèles

b. Seuil indicatif de risque

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque.

c. Analyse de risque

Il est recommandé de poser des pièges chromatiques dans les parcelles concernées pour évaluer le taux de présence et décider des actions à mettre en œuvre pour la campagne 2027.

Les pièges chromatiques sont à poser en début de vol et suivis pendant une période de 6 semaines.

d. Gestion alternative du risque

En présence de larves de chrysomèles des racines du maïs, la rotation de culture est recommandée.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site [EcophytoPIC](https://ecophytoPIC.fr).



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**



La stratégie
ecophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

