

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°25 – 12 août 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

MAÏS

Stade : Une majorité de parcelles au 50 % d'humidité du grain.

Pyräle : Le second pic de la bivoltine est passé

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

13 Maïs.



Une météo encore très chaude et sèche avec des orages ponctuels.

- Prévision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18	MERCREDI 19
						
18° / 36°	16° / 37°	18° / 37°	19° / 29°	17° / 26°	16° / 25°	14° / 26°
▲ 10 km/h	🔄 5 km/h	▲ 10 km/h	▼ 5 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 10 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, 11/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18	MERCREDI 19
						
19° / 35°	18° / 36°	20° / 36°	20° / 29°	19° / 27°	17° / 26°	16° / 27°
▲ 5 km/h	🔄 5 km/h	▲ 5 km/h	► 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	► 10 km/h

(Source : Météo France, 04/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Altkirch :


JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18	MERCREDI 19
						
16° / 35°	16° / 36°	20° / 35°	19° / 29°	17° / 25°	15° / 25°	15° / 26°
▲ 5 km/h	🔄 5 km/h	▲ 15 km/h	► 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h 40 km/h	► 15 km/h

(Source : Météo France, 04/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Stades phénologiques

13 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine, réparties sur l'ensemble du territoire. Les stades continuent à évoluer rapidement à la faveur des températures élevées et de l'irrigation pour les secteurs concernés. La maturité du grain s'approche rapidement.



Stades observés - Nombre de parcelle



Attention ! Échelle communément utilisée par ARVALIS :


Concordance des stades avec l'échelle BBCH : 50% Humidité du grain (BBCH 83-85), Ensilage (BBCH 86-89)

2 Pyrales

a. Observations

Le second pic de vol de la pyrale bivoltine est passé. 7 pièges sur 9 du secteur de la bivoltine (Plaine sud du Bas-Rhin et Hardt) capturent des papillons de pyrale. Le nombre de papillon capturé est en nette diminution.

Dynamique de vol de la pyrale - réseau piégeage phéromone BSV Alsace




b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à priori pour ce ravageur.

c. Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à partir des observations actuelles pour la lutte contre la pyrale. L'analyse du risque se base sur l'infestation larvaire à l'automne précédent qui était plutôt faible sur l'ensemble du territoire. Les conditions climatiques annoncées pour la semaine prochaine n'est pas favorable à la réussite des pontes. Le risque est donc plutôt faible pour l'instant.



Prospection larvaire 2025

d. Gestion alternative du risque



Il existe des solutions de biocontrôle pour protéger les maïs contre la pyrale. La liste est disponible sur ce lien : [Liste des produits de biocontrôle | Ecophytopic.](#)

Les trichogrammes (*Trichogramma brassicae*) peuvent être utilisés pour protéger les parcelles de maïs. Ces petits hyménoptères spécifiques de la pyrale déposent leurs œufs dans ceux du ravageur. Les larves qui se développent se nourrissent des œufs de pyrale, détruisant ainsi les populations de ravageurs. La pose des trichogrammes devrait s'effectuer au cours de cette semaine pour les secteurs précoces.

Des méthodes alternatives existent également, pour plus d'informations, consulter la fiche [pyrale du maïs](#).



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

