

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°2 – 25 février 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

COLZA

Stade : Reprise de végétation. Début montaison dans presque 50 % des parcelles.

Charançon de la tige du colza : Le vol n'a pas encore débuté à l'échelle du territoire alsacien. Le risque va augmenter avec les conditions climatiques plus douces annoncées pour les prochains jours.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

13 Colza.



- Prévision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 26	VENDREDI 27	SAMEDI 28	DIMANCHE 01	LUNDI 02	MARDI 03	MERCREDI 04
6° / 18°	7° / 18°	8° / 14°	4° / 16°	3° / 16°	5° / 15°	6° / 14°
↙ 5 km/h	↙ 10 km/h	➤ 10 km/h	↙ 10 km/h	↗ 10 km/h	↙ 10 km/h	↙ 10 km/h

(Source : Météo France, 24/02/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 26	VENDREDI 27	SAMEDI 28	DIMANCHE 01	LUNDI 02	MARDI 03	MERCREDI 04
6° / 19°	5° / 19°	7° / 13°	3° / 16°	2° / 18°	4° / 18°	5° / 15°
↗ 15 km/h	↗ 15 km/h	➤ 10 km/h	↙ 5 km/h	↗ 10 km/h	↙ 5 km/h	↙ 10 km/h

(Source : Météo France, 24/02/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Altkirch :

JEUDI 26	VENDREDI 27	SAMEDI 28	DIMANCHE 01	LUNDI 02	MARDI 03	MERCREDI 04
5° / 18°	4° / 20°	6° / 12°	2° / 16°	2° / 17°	4° / 18°	4° / 16°
➤ 15 km/h	➤ 10 km/h	➤ 15 km/h	↗ 10 km/h	↗ 5 km/h	➤ 15 km/h	➤ 15 km/h 40 km/h


(Source : Météo France, 24/02/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Stades phénologiques

La reprise de végétation est effective pour 92 % des parcelles du réseau. La montaison est engagée dans 46 % des situations (stade C2 - BBCH31 – entre-nœuds visibles).

Répartition des stades du colza




Localisation des parcelles observées



(Terres Inovia)

Les pièges sur végétation doivent être remis en place dans les parcelles de colza pour être en mesure de capturer, le moment venu, les premiers charançons qui se porteront sur les cultures.



Placer la cuvette à au moins 10 mètres au-delà de la bordure de la parcelle et si possible à proximité d'un ancien champ de colza de l'année précédente.

Remplir les cuvettes avec environ 1 litre d'eau additionnée de quelques gouttes de mouillant (liquide vaisselle sans parfum).

Le fond de la cuvette suit le niveau supérieur de la végétation.

Réaliser 1 relevé au moins 1 fois par semaine.

Eviter le piétinement qui modifie le contexte de végétation autour du piège. Si nécessaire, déplacer la cuvette.

Nettoyer régulièrement la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive.

2 Charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)

Le charançon de la tige du colza est un gros charançon de couleur gris cendré avec le bout des pattes noir. Les piqûres de ponte du charançon de la tige du colza entraînent une désorganisation cellulaire qui déforme la tige, voire engendre des éclatements. La nuisibilité est d'autant plus importante que les printemps sont secs.

L'arrivée des charançons de la tige du colza est souvent concomitante avec le vol de **charançons de la tige du chou**. Cet autre charançon, avec le bout de pattes roux et une tache blanchâtre dorsale entre le thorax et l'abdomen, est historiquement considéré comme peu nuisible dans des conditions normales de culture. Les colzas peuvent supporter sans dommage un grand nombre de larves de charançons de la tige du chou dans la moelle de la tige. Toutefois, la nuisibilité des larves de charançon de la tige du chou est difficile à appréhender et interroge ces dernières années. Les fortes infestations peuvent impacter les plus petits colzas avec un faible diamètre de tige et les nombreuses piqûres à l'aisselle des feuilles peuvent favoriser l'installation des maladies responsables des pieds secs en fin de cycle. Des références sont en cours d'acquisition dans les conditions actuelles de culture. Aujourd'hui, le risque est géré indirectement par la protection qui vise le charançon de la tige du colza.

Charançon de la tige du CHOU

Ceutorhynchus quadridens



Charançon de la tige du COLZA

Ceutorhynchus napi Gyll.



photos Terres Inovia

a. Observations

Sur 11 parcelles ayant fait l'objet d'une observation spécifique, des charançons de la tige du colza ne sont observés que sur une seule parcelle à SCHWEIGHOUSE-THANN (68) avec 3 captures enregistrées cette semaine.

Les conditions climatiques encore bien agitées (vent et pluie) de la semaine dernière n'ont pas été favorables au vol du ravageur.

b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque. On considère qu'il y a un risque dès lors que sa présence est relevée sur la parcelle et après un délai de 8 à 10 jours (nécessaire à la maturation des femelles) du stade C2 à E (boutons séparés) inclus.

c. Analyse de risque

Pour le moment, le vol n'a pas encore débuté de manière significative sur le territoire alsacien. Les conditions météorologiques plus douces, moins venteuses et plus ensoleillées, annoncées pour les prochains jours, seront favorables au déclenchement du vol ou bien encore à l'activité en parcelle des premiers individus capturés. Le risque faible pour l'instant, augmentera dans les prochains jours.

Les premières captures, localisées à REININGUE la semaine dernière et à SCHWEIGHOUSE-THANN cette semaine, incitent à surveiller préférentiellement les parcelles abritées du vent dans le sud de la région et à remettre en place les pièges sur végétation si ce n'est pas déjà fait.





Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Cristal Union et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr



« Action de la Stratégie Écophyto 2030 pilotée par les ministères chargés de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. »

