



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°12 – 1er juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Début fermeture (BBCH 77) à fermeture (BBCH 79).

MILDIOU

Peu de risque de contamination.

OÏDIUM

Contrôle des parcelles sensibles.

TORDEUSES

Amorce des pontes.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)

PRODUITS DE BIOCONTROLE :



Des produits de biocontrôle existent pour la gestion des bioagresseurs, liste 2026

<https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>



Le réseau compte **43 parcelles** cette semaine.



1 Stade

Malgré la canicule, les baies continuent à grossir et sont actuellement entre début fermeture (BBCH 77) à pleine fermeture (BBCH79). La vigne s'autorégule avec les conditions climatiques complexes. La coulure peut être marquée avec des grappes très aérées. Le Riesling est particulièrement impacté, tout comme les parcelles trop enherbées. Ce phénomène est lié aux vagues de chaleur et stress hydrique. Il aura un poids sur les rendements attendus.

Les coups de chauds ont été essentiellement induits par les fortes températures associées ou non au soufre. Le cépage et la vigueur peuvent accentuer les dégâts.



Stade fermeture
(BBCH 79)



Brûlures sur feuille et grappe



Jeune parcelle en stress (coteau Scherwiller)



Coulure

2 Données météo

L'épisode de canicule est enfin terminé mais pour combien de temps ? Depuis le 13 juin, les températures maximales ont dépassé les 30°C. La semaine dernière a battu tous les records puisque les températures moyennes journalières sont aussi passées au-dessus de la barre des 30°C. Samedi dernier aura été la journée la plus chaude avec, par exemple, 44.56°C en température maximale pour la station de la Hardt de Colmar.

Ce même samedi s'est localement soldé par des orages, et dans la nuit de dimanche à lundi, de nouveaux épisodes orageux ont éclaté.

Une fois encore, toutes les communes n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces pluies. L'amplitude est très grande : 55mm en cumul pour Kayersberg-vignoble à moins de 2 mm pour les moins « chanceuses ». Le secteur autour de Colmar a été le plus arrosé. Toutefois, il y a une contrepartie avec la grêle (10-30%) qui a touché plusieurs communes : Colmar, Ammerschwihr, Niedermorschwihr, Katzenthal...

A ce stade, les baies vont avoir le temps de sécher et tomber mais c'est encore un stress supplémentaire pour la plante.



Grêle Hardt de Colmar

L'arrosage des complants et jeunes plantations reste d'actualité au vu de l'état des sols sur ce mois de juin, l'eau n'est en effet pas descendue en profondeur.

Les prochains jours devraient être « plus frais » avec encore un petit espoir d'eau pour mercredi mais à partir de dimanche, il est fort probable que la chaleur soit de retour, et des maximales à plus de 35°C sont à nouveau envisagées.

Prévisions des prochains jours station de Colmar :

JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
						
17° / 27°	18° / 27°	15° / 30°	16° / 31°	19° / 31°	19° / 32°	20° / 31°
► 10 km/h	► 15 km/h	▼ 5 km/h	► 10 km/h	▼ 5 km/h	► 5 km/h	▼ 10 km/h

(Source : Météo France, ville de Colmar, 30/06/2026 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Observations

Aucune évolution au sein du vignoble. Toutes les parcelles du réseau sont indemnes, y compris les parcelles non traitées.

2 Analyse de risque

Le mildiou est incompatible avec la canicule. Les rares taches ne sporulent pas par fortes chaleurs. Les grappes sont saines.

Bien qu'il y ait eu des orages localement, le risque de voir des taches reste faible et quand bien même, elles auraient du mal à sporuler car les prochains jours sont à nouveau être chauds, secs voire potentiellement caniculaires.



1 Observations

Le bilan 100 parcelles à la fermeture de la grappe sera réalisé par la Chambre d'agriculture ces jeudi et vendredi. Les résultats seront communiqués dans le BSV à venir.

Cette semaine confirme que dans les parcelles où l'oïdium est installé, la chaleur ne l'a pas calmé. C'est le cas entre autre, dans des parcelles témoin non traitées.

On peut aussi identifier des parcelles où il fait son entrée timide (1-2 baies par grappe).

La grande majorité des parcelles restent indemnes.




Oïdium sur grappe

2 Analyse de risque

Le stade fermeture (BBCH 79) est associé classiquement à une fin de sensibilité des grappes à de nouvelles contaminations. La grande majorité des parcelles n'a pas été protégée depuis plus de 15 jours, voire 3 semaines en raison de la canicule.

La surveillance des parcelles, en particulier de celles les plus sensibles, est importante cette semaine. Il ne faut pas sous-estimer l'oïdium qui peut résister aux fortes chaleurs et peut refaire surface post fermeture dans les parcelles sensibles.



3 Gestion alternative du risque

Dernière ligne droite pour l'effeuillage des parcelles qui ne sont pas encore fermées et qui présentent des résidus de floraison.

Des fiches par bioagresseur et des fiches prophylaxie sont disponibles [ici](#)



TORDEUSES

Sommaire

1 Observations

Les 2 premières pontes ont été observées en fin de semaine dernière.

Les observations de ce lundi confirment le début de l'activité des pontes mais dans des proportions faibles jusque-là.

Seuls les secteurs à fort historique (type Hunawihr, Sigolsheim...) présentent plusieurs pontes sur 50 grappes (jusqu'à 15 pour 50 grappes).

Pour les parcelles habituellement peu impactées par les vers, on note au maximum 2 pontes pour 50 grappes.

A ce jour, des pontes ont d'ores et déjà avorté sous l'effet de la chaleur.




Ponte fraîche sur
Riesling

2 Analyse de risque

Les conditions météorologiques de cette semaine sont plus adaptées à l'activité de ponte. Les premières éclosions sont attendues pour la fin de semaine.

Si la météo se profile à nouveau vers une canicule la semaine prochaine, cela devrait limiter le risque de pontes et multiplier les avortements.

Limiter la surveillance aux secteurs et cépages à fort historique.



3 Gestion alternative du risque

L'effeuillage permet de réduire le risque en mettant les grappes à la lumière et à la chaleur.

Des fiches sur les méthodes alternatives sont disponibles [ici](#).



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : CAC – Ampélys, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

Rédaction et animation : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr