Bulletin de Santé du Végétal

Champagne-Ardenne grandes cultures

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

12 novembre 2026

BILAN POIS DE PRINTEMPS 2026

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe

Présentation du réseau d'épidémiosurveillance

Évolution des stades en cours de campagne

Bilan sanitaire 2026

Facteurs de risque phytosanitaire

Bilan par bioagresseur (ordre chronologique)

- Thrips
- Sitone du pois
- Puceron vert du pois
- Complexe maladie ABC
- Tordeuse du pois


Le réseau 2026 compte **12 parcelles de pois de printemps** observées.

1 Présentation du réseau d'épidémiosurveillance

Ce BSV présente le bilan de l'état sanitaire de la campagne 2026 et fait un focus sur les principaux bioagresseurs en Champagne-Ardenne.

8 partenaires ont participé au réseau d'observation dans le cadre du BSV, pour un total de 12 parcelles.

Localisation des parcelles du réseau 2026



2 Evolution des stades en cours de campagne

Les stades sont exprimés en pourcentage de stade atteint sur les parcelles observées chaque semaine.

STADE	N° de semaine											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Non levée (BBCH 00)				9.00%	11.00%							
Levée (BBCH 10)	40.00%					9.00%						
1 feuille (BBCH 11)	40.00%						11.00%					
2 feuilles (BBCH 12)	20.00%	44.00%										
3 feuilles (BBCH 13)		33.00%	29.00%									
4 feuilles (BBCH 14)		22.00%	43.00%									
5 feuilles (BBCH 15)			14.00%	45.00%								
6 feuilles (BBCH 16)			14.00%	27.00%	11.00%			9.00%				
7 feuilles (BBCH 17)				18.00%	33.00%							
8 feuilles (BBCH 18)					33.00%	18.00%						
9 feuilles (BBCH 19)					11.00%	18.00%	11.00%					
10 feuilles (BBCH 19)						45.00%				10.00%		
11 feuilles (BBCH 19)							33.00%			10.00%		
12 feuilles (BBCH 19)						9.00%	33.00%					
Début Floraison							11.00%	64.00%	70.00%			
Jeunes Gousses 2 cm								27.00%	30.00%	30.00%		
Fin Floraison (BBCH 69)										50.00%	56.00%	
Stade Limite Avortement (BBCH 71)											22.00%	29.00%
Fin Stade Limite Avortement (BBCH 79)											22.00%	71.00%
Maturité Physiologique (BBCH 85)												

3 Bilan sanitaire 2026

Bioagresseurs	Qualification de la pression 2026	Comparaison avec 2025
Thrips	Nulle	<
Sitone du pois	Moyenne	>
Puceron vert du pois	Moyenne	>
Complexe maladie	Faible	<
Tordeuse du pois	Moyenne	=

4 Facteurs de risque phytosanitaire

Les semis sont effectués au cours du mois de mars, dès lors que les sols sont suffisamment ressuyés. Les pois de printemps lèvent principalement à la fin du mois de mars.

Par la suite, les pois ont connu des conditions sèches au cours du mois d'avril, mais ont globalement présenté un bon développement végétatif. Avant le retour des pluies à la fin du mois d'avril, certaines parcelles ont présenté des signes de sénescence précoce sur les feuilles basses, sous l'effet du stress hydrique pouvant parfois être confondues avec de la maladie.

S'en est suivie une vague de chaleur d'une précocité remarquable, qui a coïncidé avec l'entrée en floraison des pois de printemps au cours de la dernière décade de mai. Les températures très élevées ont écourté la durée de floraison dans les situations soumises à une forte tension hydrique, avec une floraison limitée à 7-10 jours au maximum. À l'inverse, la floraison s'est maintenue dans les sols où la disponibilité en eau est restée suffisante (bonne réserve utile et/ou précipitations).
Par la suite, la seconde vague de chaleur, survenue à la mi-juin, a pénalisé le remplissage des grains et, par conséquent, le PMG.

Les conditions extrêmement chaudes et sèches expliquent les performances faibles à moyennes des pois de printemps cette année. Les rendements sont très hétérogènes selon les secteurs et la disponibilité en eau. Ils s'échelonnent de 10 q/ha à 40 q/ha, avec une moyenne autour de 25 q/ha.

Cette année, le contexte sanitaire est resté sain et n'explique pas les performances de la culture. Ce sont principalement les facteurs abiotiques : les stress thermique et hydrique, qui ont pénalisé les rendements.

5 Bilan par bioagresseur

a. Thrips


Le ravageur n'est jamais observé.

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Thrips	Fréquence	X				<
	Intensité	X				

b. Sitone du pois

Des morsures de sitones sont régulièrement observées dans les parcelles à partir de la première semaine d'avril. Au maximum, 57 % des parcelles dépassent le seuil indicatif de risque fixé à 5 à 10 encoches sur les dernières feuilles.


La pression exercée par le ravageur cette année est plus forte que la campagne précédente sans que les intensités d'attaque soient exceptionnelles.



Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Sitone du pois	Fréquence			X		>
	Intensité			X		

c. Puceron vert du pois


Au plus fort de l'infestation (mi-mai), la présence de pucerons est repérée dans 100 % des parcelles. Néanmoins, les niveaux d'infestation sont faibles tout au long du printemps. Ils ne dépasseront quasiment jamais 5 à 10 pucerons par plante. Le seuil indicatif de risque, variable selon le stade de la culture, n'est jamais atteint.



Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Puceron vert	Fréquence			X		>
	Intensité		X			

d. Complexe maladie ABC


La pression maladie a été faible sur l'ensemble de la campagne. Quelques traces ont pu ponctuellement être observées en fin de cycle avec des symptômes faibles en fréquence et en intensité.



Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Complexe maladie ABC	Fréquence		X			<
	Intensité		X			

e. Tordeuse du pois

Le vol débute à la mi-mai. Au terme de la période de surveillance des cultures, le seuil indicatif de risque fixé pour l'alimentation humaine et la production de semences (100 captures cumulées) est dépassé dans 71 % des situations (100 % en 2025). Le seuil défini pour l'alimentation animale (400 captures cumulées) est atteint dans 8 % des situations (15 % en 2025).



Département	Commune	Captures cumulées
51	FAUX-VÉSIGNEUL	155
51	SAINT-MARD-LÈS-ROUFFY	161
10	COOLE	160
52	BAYARD-SUR-MARNE	0
10	ROSNAY-L'HÔPITAL	24
51	HANS	106
51	MARSON	414

Captures cumulées de tordeuses sur l'ensemble de la campagne par commune

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Tordeuse	Fréquence		X			=
	Intensité			X		

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Arvalis - Institut du Végétal, ATPPDA, Cérèsia, CETA Craie Marne Sud, CETA de Champagne, CETA de Romilly, Chambre d'Agriculture des Ardennes, Chambre d'Agriculture de l'Aube, Chambre d'Agriculture de la Marne, Chambre d'Agriculture de la Haute-Marne, Cristal Union, DIGIT'AGRI, EIMR Marjollet Regis, EMC2, ETS RITARD, FREDON Grand Est, GRCETA de l'Aube, GRCETA de Troyes, ITB, NOVAGRAIN, SCA de Juniville, SCA d'Esternay, SCARA, SEPAC – Compagri, SOUFFLET Agriculture, TEREOS, Terres Inovia, VIVESCIA.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB
La stratégie écophyto 2030
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
ARVALIS
FREDON GRAND EST
ITB Institut Technique de la Betterave
Terres Inovia