



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°13 – 7 octobre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

CHRYSANTHÈMES

Stade : Les boutons floraux des chrysanthèmes multifleurs sont bien détachés tandis que ceux des chrysanthèmes grosses fleurs sont éclatés et laissent apparaître le début de la coloration.

Pucerons : Quelques colonies de pucerons cachés sous les feuilles ou dans les boutons floraux.

Thrips : Présence d'intensité faible et localisée. Les lâchers d'acariens prédateurs sont à poursuivre.

Chenilles défoliatrices : Toujours une présence d'intensité faible et localisée - Apport de *Bacillus thuringiensis* *Kurstaki* selon le niveau de présence.

CYCLAMENS ET CULTURES D'AUTOMNE

Stade : Les séries de pensée pour l'automne sont en pleine floraison et la commercialisation gagne en intensité, tandis que la floraison des cyclamens se poursuit.

Pucerons : Absents.

Thrips : Absents.

Dépérissement racinaire : Rares sont les observateurs qui signalent des dépérissements racinaires sur pensées.

POINSETTIAS

Stade : Les plantes poursuivent leur croissance végétative.

Thrips : Présence très localisée et de très faible intensité - Lâchers d'acariens prédateurs.

Aleurodes : Présence faible et localisée, mais poursuite des contrôles pour éviter la présence d'adultes en fin de culture.

VÉGÉTAUX DE PÉPINIÈRE

Stade : Les couleurs d'automne s'installent progressivement.

Pucerons : Rares foyers, sur les dernières jeunes pousses.

NOTES BIODIVERSITÉ

ARRETÉ ABEILLES

Les toutes premières fleurs commencent à être observées, dans ces situations, les règles de l'arrêté Abeilles-Pollinisateurs s'appliquent.

Bioagresseurs	Précisions sur le risque	Evaluation du risque
Pucerons	Quelques foyers localisés sous les feuilles ou dans les boutons floraux des chrysanthèmes et sur les dernières jeunes pousses en pépinière.	Faible - Modéré
Thrips	Présence faible et localisée dans les cultures de chrysanthème.	Faible - Modéré
Chenilles défoliatrices	Quelques signalements sur les chrysanthèmes.	Faible – A surveiller
Dépérissement racinaire sur pensées	Rares signalements de dépérissement racinaire sur pensées.	Faible – A surveiller
Aleurodes	Présence faible et localisé dans les cultures de poinsettias.	Faible – A surveiller

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](https://r4p.inra.fr)



Le réseau compte **16 parcelles** observées cette semaine.



Prévisions météo à 7 jours pour Nancy :

JEUDI 08	VENDREDI 09	SAMEDI 10	DIMANCHE 11	LUNDI 12	MARDI 13	MERCREDI 14
						
11° / 15°	7° / 16°	9° / 15°	8° / 15°	8° / 17°	10° / 18°	10° / 19°
⬆️ 20 km/h 45 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 20 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 15 km/h 45 km/h	⬆️ 15 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, ville de Nancy, 06/10/26 à 10H Retrouvez les données météo actualisées [ici](#)).

Prévisions météo à 7 jours pour Strasbourg :

JEUDI 08	VENDREDI 09	SAMEDI 10	DIMANCHE 11	LUNDI 12	MARDI 13	MERCREDI 14
						
12° / 17°	8° / 17°	9° / 15°	9° / 15°	9° / 17°	10° / 18°	10° / 19°
⬆️ 20 km/h 45 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 10 km/h	⬆️ 10 km/h	⬆️ 10 km/h	⬆️ 10 km/h

(Source : Météo France, ville de Strasbourg, 06/10/26 à 10H. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#)).

Prévisions météo à 7 jours pour Reims :

JEUDI 08	VENDREDI 09	SAMEDI 10	DIMANCHE 11	LUNDI 12	MARDI 13	MERCREDI 14
						
12° / 17°	6° / 15°	12° / 17°	10° / 17°	10° / 18°	12° / 20°	11° / 20°
⬆️ 20 km/h 45 km/h	⬆️ 20 km/h	⬆️ 20 km/h 40 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 15 km/h	⬆️ 20 km/h 40 km/h	⬆️ 15 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, ville de Reims, 06/10/26 à 10H. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#)).

Après une baisse des températures en fin de semaine accompagnée d'un passage pluvieux, le retour des températures proches des normales de saison est annoncé dès le début de la semaine prochaine.



Récolte de châtaignes
(M.A. JOUSSEMET, Planète LFP)



1 Stade des cultures

Les boutons floraux des chrysanthèmes multifleurs sont bien éclatés et en tout début de coloration, tandis que la couleur des boutons des variétés précoces à grosses fleurs est bien visible.

2 Pucerons

a. Observations

La présence de foyers de pucerons reste toujours faible et localisée. Ils sont alors présents en colonies sur les hampes florales des variétés à grosses fleurs ou dispersés sous les feuilles.



Boutons éclatés et colorés
(C. STRACH, Planète LFP)




Pucerons groupés sur la hampe florale ou éparpillés sous les feuilles
(C. STRACH (gauche) et M. LITZLER (droite), Planète LFP)

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation de pucerons dans les cultures, le risque de propagation est à prendre en considération car ils déprécient la plante.

c. Analyse de risque

Les pucerons sont à surveiller, en fonction de l'évolution des températures.



d. Gestion alternative du risque



Un dernier apport de micro-hyménoptères parasitoïdes comme les *Aphidius* est à privilégier sur les pucerons isolés ou les populations très faibles.

Pour aller plus loin : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html>

3 Thrips

a. Observations

Comme pour les pucerons, la présence de thrips est de faible intensité et localisée sur des variétés sensibles.

b. Seuil indicatif de risque


Dès la présence de plusieurs larves de thrips sur les plantes, les dégâts sont visibles. Non seulement, les piqûres sont susceptibles de faire avorter les boutons floraux, mais les thrips sont aussi des vecteurs du virus TSWV. En effet en blessant la plante, ils créent une voie d'entrée pour le virus.



Dégâts sur feuilles dus aux piqûres de thrips
(M. LITZLER, Planète LFP)

c. Analyse de risque

Les thrips sont à surveiller, en fonction de l'évolution des températures sous les abris et de la sensibilité variétale.



d. Gestion alternative du risque



Un dernier lâcher d'acariens prédateurs peut être effectué par sécurité.



Les thrips sont exposés à un risque de résistance au spinosad, dans les cultures sous serre.

Pour aller plus loin : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html>

4 Chenilles défoliatrices

a. Observations

Quelques observateurs signalent la présence de trous dans les feuilles, dus à des chenilles défoliatrices.

b. Seuil indicatif de risque


Dès l'observation répétée de feuilles trouées ou de boutons floraux grignotés dans les cultures, le risque est à prendre en compte.



Cœur du bouton floral mangé par une chenille
(C. STRACH, Planète LFP)

c. Analyse de risque

Les trous dans le feuillage et les boutons floraux grignotés, qui donnent naissance à des fleurs déformées, déprécient la valeur commerciale du chrysanthème.



d. Gestion alternative du risque



En cas d'observation de plusieurs chenilles par plante, il est possible d'utiliser le *Bacillus thuringiensis* *Kurstaki* comme méthode de lutte.

Le Bacillus ou Bt est une bactérie qui produit des toxines. Consommée par les chenilles, celle-ci attaque les cellules intestinales provoquant leur mort en quelques jours.



1 Stade des cultures

Les séries de pensées pour l'automne sont en pleine floraison et la commercialisation gagne en intensité. Celle des cyclamens se poursuit.



Serre de viola et culture de cyclamen en début de floraison (C. STRACH, Planète LFP)

2 Thrips et pucerons

a. Observations


Thrips et pucerons sont absents des cultures.

b. Seuil indicatif de risque

Selon l'évolution des températures enregistrées sous les abris, le risque de présence de ces ravageurs est à suivre.

c. Analyse de risque

La présence de ces ravageurs est à surveiller en fonction de l'évolution des températures.



d. Gestion alternative du risque



Pour les thrips, l'installation de panneaux englués bleu au-dessus des végétaux permet de détecter les premiers individus adultes et de suivre ainsi l'évolution des populations. Dès le doublement du nombre des adultes collés sur les panneaux englués, des acariens prédateurs comme les *Amblyseius cucumeris* ou *A. swirskii* peuvent être apportés dans les cultures.



Les thrips sont exposés à un risque de résistance au spinosad, dans les cultures sous serre.

Pour aller plus loin : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html>

3 Dépérissement racinaire

a. Observations

Quelques cas de dépérissements racinaires sont signalés sur *Viola cornuta*. Les plantes perdent de la vigueur, le feuillage se décolore, flétrit et la plante meurt. L'observation racinaire, met en évidence une pourriture des racines. Seule une analyse de l'échantillon permet d'identifier avec certitude le champignon responsable.

b. Seuil indicatif de risque


La maladie se propage par tache et les dégâts sont rapidement préjudiciables pour les plantes. En effet, affaiblies et plus alimentées, les violas meurent rapidement. Dès l'apparition de quelques plantes malades, le seuil indicatif de risque est atteint.



Dépérissement racinaire sur *Viola cornuta* – vue d'ensemble de la culture et zoom sur une plante atteinte (M. LITZLER, Planète LFP)

c. Analyse de risque

Le risque d'apparition des dépérissements racinaires est fortement lié aux pratiques culturales notamment aux arrosages et à la fertilisation. Le risque reste faible et localisé aux variétés sensibles.



d. Gestion alternative du risque



Il est nécessaire de mettre en place dès le début de la culture, des mesures prophylactiques (choix du substrat et de son pH, pots neufs, culture posée au sol sur couche drainante ou surélevée) avec une maîtrise des rythmes d'arrosage et de la fertilisation.

Pour aller plus loin : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html>



1 Stade des cultures

Les plantes poursuivent leur développement végétatif et gagnent en volume. A ce stade, les cultures sont quasiment indemnes de ravageurs.

2 Thrips

a. Observations


Très peu présents dans les cultures.

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation du doublement des individus collés sur les panneaux englués jaunes, le risque de propagation est à prendre en compte.

c. Analyse de risque

Très peu observés dans les cultures.



d. Gestion alternative du risque



Pour les thrips, l'installation de panneaux englués au-dessus des végétaux permet de détecter les premiers individus adultes. Il faut surveiller l'évolution de la population. Peuvent être mis en place, des lâchers d'acariens prédateurs comme les *A.cucumeris* ou *A.swirskii*.

L'installation de seau de *Dalotia coriaria*, coléoptère prédateur de la famille des Staphylinidae, permet de compléter la mise en place des méthodes de lutte alternatives.



Les thrips sont exposés à un risque de résistance au spinosad, dans les cultures sous serre.

Pour aller plus loin : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html>



Culture de poinsettia (C. STRACH, Planète LFP)

3 Aleurodes

a. Observations

Très peu présents.

b. Seuil indicatif de risque

L'installation de panneaux jaunes englués dans les cultures permet de suivre l'évolution des populations d'aleurodes. Dès la capture de quelques adultes sur les panneaux, le seuil indicatif de risque est atteint. En effet, en cas de forte infestation, les piqûres provoquées par les aleurodes ralentissent le développement des plantes.



Larves d'aleurode face inférieure
d'une feuille de poinsettia
(C. STRACH, Planète LFP)

c. Analyse du risque

A ce stade, le risque reste faible. Néanmoins, il faut suivre l'évolution du nombre d'individus collés sur les panneaux englués.



d. Gestion du risque



L'apport d'*Amblyseius montdorensis*, acarien prédateur qui s'attaque avec voracité aux œufs et aux larves des aleurodes, ou d'*Amblyseius swirskii* plus polyphage, consommant également des thrips, permet de limiter efficacement les populations.



Le groupe ALEURODES / CULTURES SOUS SERRE / Pyréthrinoïdes de synthèse est exposé à un risque de résistance.



1 Stades phénologiques

Les végétaux se parent petit à petit de leurs couleurs automnales

2 Pucerons

a. Observations

Les foyers de pucerons sont rares, seules les jeunes pousses hébergent encore quelques foyers.

b. Seuil indicatif de risque

Sur ces cultures, les pucerons sont responsables d'un ensemble de dégâts : jaunissement du feuillage, crispation des feuilles, installation de fumagine, dépréciation globale de la plante et ralentissement de sa croissance et de sa floraison.

c. Analyse de risque

Suivre l'évolution des températures des prochains jours, car la vitesse de développement des pucerons, comme celle de beaucoup d'autres ravageurs, est fortement dépendante des conditions climatiques.



d. Gestion alternative du risque



Il est nécessaire d'attirer les auxiliaires naturels encore présents dans les cultures comme les syrphes et les chrysopes avec des plantes nectarifères à floraison automnale.



Coloration automnale du liquidambar
(M.A. JOUSSEMET, Planète LFP)



Foyer de pucerons sur photinia
(M. LITZLER, Planète LFP)



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Horticulteurs et pépiniéristes volontaires, Conseillers horticolas (Planète Légumes Fleurs et Plantes, Astredhor Est).

Rédaction et animation : Planète Légumes Fleurs et Plantes.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr