Bulletin de Santé du Végétal

horticulture & pépinière Grand Est

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

BSV n°14 – 21 octobre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

CHRYSANTHÈMES

CYCLAMENS ET CULTURES D'AUTOMNE

POINSETTIAS

NOTES BIODIVERSITÉ

CHRYSANTHÈMES

Stade : La floraison des chrysanthèmes multifleurs ainsi que celles des grosses fleurs est en cours. Cependant, les stades sont plus ou moins avancés selon les variétés et les pratiques culturales. La commercialisation commence à peine.

Pucerons *:* Rares individus cachés dans les boutons floraux des chrysanthèmes à grosses fleurs.

Thrips : Très peu observés.

CYCLAMENS ET CULTURES D'AUTOMNE

Stade : En pleine floraison et la commercialisation a démarré.

Pucerons : Absents.

Thrips : Absents.

Chenilles défoliatrices : Rares cas signalés. Pulvérisation de *Bacillus thuringiensis Kurstaki* selon le niveau de présence.

Acariens : Quelques signalements de foyers localisés sur pensées.

POINSETTIAS

Stade : Les plantes poursuivent leur croissance végétative. Le rougissement des bractées commence lentement.

Aleurodes : : Absents ou peu présents.

NOTES BIODIVERSITÉ

Bioagresseurs	Précisions sur le risque	Evaluation du risque
Pucerons	Quelques foyers localisés dans les boutons floraux des chrysanthèmes.	**Faible - Modéré**
Thrips	Présence faible et localisée dans les cultures de chrysanthème.	**Faible - Modéré**
Chenilles défoliatrices	Rares cas signalés sur primevères.	**Faible – A surveiller**
Acariens	Quelques signalements de foyers localisés sur pensées.	**Faible – A surveiller**
Aleurodes	Présence très faible et localisée dans les cultures de poinsettias.	**Faible – A surveiller**

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

Rapports techniques sur les résistances en France – R4P (r4p-inra.fr)

Le réseau compte **16 parcelles** observées cette semaine.

Prévisions météo à 7 jours pour Nancy :

JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28
6° / 15°	8° / 14°	7° / 13°	8° / 14°	7° / 15°	9° / 15°	7° / 15°
20 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	20 km/h	25 km/h	15 km/h
45 km/h	70 km/h	65 km/h	60 km/h	45 km/h	55 km/h	40 km/h

(Source : Météo France, ville de Nancy, 21/10/26 à 10H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

Prévisions météo à 7 jours pour Strasbourg :

JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28
7° / 15°	8° / 16°	8° / 13°	8° / 15°	8° / 15°	9° / 15°	8° / 15°
20 km/h	25 km/h	30 km/h	25 km/h	20 km/h	15 km/h	10 km/h
45 km/h	60 km/h	60 km/h	55 km/h	40 km/h	45 km/h	

(Source : Météo France, ville de Strasbourg, 21/10/26 à 10H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

Prévisions météo à 7 jours pour Reims :

JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28
8° / 16°	10° / 14°	8° / 15°	10° / 16°	8° / 16°	10° / 16°	9° / 16°
20 km/h	35 km/h	30 km/h	25 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h
55 km/h	80 km/h	70 km/h	60 km/h	55 km/h	60 km/h	40 km/h

(Source : Météo France, ville de Reims, 21/10/26 à 10H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

Les sept prochains jours sont annoncés venteux et pluvieux sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Les rafales de vents pourraient atteindre jusqu'à 70km/h. Coté des températures, elles devraient rester au-dessus des normales saisonnières.

Helvelle crépue
ou Morille d'automne – champignon toxique
(M.A.Joussemet, Planète LFP)



1 Stade des cultures

La floraison des chrysanthèmes multifleurs ainsi que celles des grosses fleurs est en cours. Cependant, les stades sont plus ou moins avancés selon les variétés et les conditions culturales.




Chrysanthèmes multifleurs (gauche) et grosses fleurs (droite)
(C.STRACH, Planète LFP)

2 Pucerons

a. Observations

Des individus cachés dans les boutons floraux des grosses fleurs sont encore signalés chez quelques observateurs. Les pucerons sortent des boutons floraux, lorsque les températures sont douces en journée, impactant la valeur commerciale de la plante.

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation de pucerons dans les cultures, le risque de propagation est à prendre en considération car ils déprécient la plante.

c. Analyse de risque

Les pucerons sont à surveiller, en fonction de l'évolution des températures.



d. Gestion alternative du risque



Etant donné les conditions météorologiques et l'avancement de la commercialisation, les lâchers ne sont plus pertinents.

Pour aller plus loin : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html

3 Thrips

a. Observations

La présence de thrips reste très faible. Ce sont les stigmates de piqures anciennes qui sont visibles sur les plantes : feuillages décolorés (désormais cachés par la floraison sur les multifleurs) et fleurs déformées impactant l'homogénéité de la coupe pour les grosses fleurs.




Piqures de thrips sur feuilles de chrysanthème.
(C. STRACH, Planète LFP)

b. Seuil indicatif de risque

Dès la présence de plusieurs larves de thrips sur les plantes, les dégâts sont visibles. Non seulement, les piqûres sont susceptibles de faire avorter les boutons floraux, mais les thrips sont aussi des vecteurs du virus TSWV. En effet en blessant la plante, ils créent une voie d'entrée pour le virus.

c. Analyse de risque

A ce stade de la culture, le risque est faible.



d. Gestion alternative du risque



Les thrips sont exposés à un risque de résistance au spinosad, dans les cultures sous serre.

Pour aller plus loin : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html

1 Stade des cultures

Les séries de pensées pour l'automne sont en pleine floraison et la commercialisation gagne en intensité. Celle des cyclamens se poursuit.



***Viola cornuta* en fleurs (N.BROUHEZ, Planète LFP)**

2 Thrips et pucerons

a. Observations


Thrips et pucerons sont absents des cultures.

b. Seuil indicatif de risque

Selon l'évolution des températures enregistrées sous les abris, le risque de présence de ces ravageurs est à suivre.

c. Analyse de risque

La présence de ces ravageurs est à surveiller en fonction de l'évolution des températures.



d. Gestion alternative du risque

B

Pour les thrips, l'installation de panneaux englués bleu au-dessus des végétaux permet de détecter les premiers individus adultes et de suivre ainsi l'évolution des populations. Dès le doublement du nombre des adultes collés sur les panneaux englués, des acariens prédateurs comme les *Amblyseius cucumeris ou A. swirskii* peuvent être apportés dans les cultures.

R

Les thrips sont exposés à un risque de résistance au spinosad, dans les cultures sous serre.
Pour aller plus loin : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html

3 Acariens

a. Observations

Trois observateurs indiquent la présence localisée de foyers d'acarien dans les cultures de pensées.




***Viola cornuta* recouverte d'acariens - stade toile et en médaillon acariens isolés (C.STRACH, Planète LFP)**

b. Seuil indicatif de risque

Les dégâts sont rapidement préjudiciables pour les cultures. A partir de quelques individus identifiés, le seuil de nuisibilité est dépassé. Les feuilles prenant un aspect métallique.

c. Analyse de risque

Le risque d'apparition des acariens est fortement lié aux conditions climatiques marquées par un air sec et doux. Le risque reste faible et localisé aux variétés sensibles.





d. Gestion alternative du risque

Il est nécessaire de procéder à des lâchers d'acariens prédateurs (tableau ci-dessous) dès l'observation des premiers tétranyques tisserands. Lorsque le stade toile est atteint, les méthodes de biocontrôle deviennent inefficaces.
Pour aller plus loin : https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/horticulture-pepinieres-a4908.html

Nom	Plage de température	Plage d'hygrométrie	Prédation	Nourrissage	Utilisation	Spécificité
Neoseiulus californicus (ancien : Amblyseius californicus)	13 à 32 °C	>60%	**Acariens (surtout *Tetranychus urticae*)**, thrips	oui	réventif ou début de foyer	plus tolérant aux températures élevées, aux faibles humidités que le Phytoseiulus persimilis. Il peut survivre plus longtemps que Phytoseiulus persimilis lorsque les acariens prédateurs sont rares
Phytoseiulus persimilis	13 à 27 °C	>70%	**Acariens (*Tetranychus urticae*)** exclusif	non		Très efficace car se nourrit uniquement de tétranyques. Résiste mal aux conditions chaudes et sèches.

4 Chenilles défoliatrices

a. Observations



Noctuelle prélevée dans une culture de primevère des jardins (N.BROUHEZ, Planète LFP)


Un observateur signale la présence de trous dans les feuilles et de chenilles défoliatrices dans la culture.

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation répétée de feuilles trouées dans les cultures, le risque est à prendre en compte.

c. Analyse de risque

Les trous dans le feuillage et les boutons floraux grignotés donnent naissance à des fleurs déformées non commercialisables.



d. Gestion alternative du risque



En cas d'observation de plusieurs chenilles, il est encore possible d'utiliser le *Bacillus thuringiensis* comme méthode de lutte. Le *Bacillus* ou « Bt » est une bactérie qui produit des toxines. Consommées par les chenilles, celles-ci attaquent les cellules intestinales provoquant leur mort en quelques jours.

1 Stade des cultures

Les poinsettias continuent leur développement dans les serres de production. Les cultures sont globalement saines et les bractées se colorent progressivement.



Culture de poinsettias en début de rougissement (C.STRACH, Planète LFP)

2 Aleurodes

a. Observations

Très peu présents.

b. Seuil indicatif de risque


L'installation de panneaux jaunes englués dans les cultures permet de suivre l'évolution des populations d'aleurodes. Dès la capture de quelques adultes sur les panneaux, le seuil indicatif de risque est atteint. En effet, en cas de forte infestation, les piqûres provoquées par les aleurodes ralentissent le développement des plantes.



Larves d'aleurode face inférieure d'une feuille de poinsettia (C. STRACH, Planète LFP)

c. Analyse du risque

A ce stade, le risque reste faible. Néanmoins, il faut suivre l'évolution du nombre d'individus collés sur les panneaux englués.



d. Gestion du risque

B

L'apport *d'Amblyseius montdorensis*, acarien prédateur qui s'attaque avec voracité aux œufs et aux larves des aleurodes, ou d'*Amblyseius swirskii* plus polyphage, consommant également des thrips, permet de limiter efficacement les poulations.

R

Le groupe ALEURODES / CULTURES SOUS SERRE / Pyréthrinoïdes de synthèse est exposé à un risque de résistance.

NOTES BIODIVERSITÉ

Sommaire

Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



























Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Horticulteurs et pépiniéristes volontaires, Conseillers horticoles (Planète Légumes Fleurs et Plantes, Astredhor Est).

Rédaction et animation : Planète Légumes Fleurs et Plantes.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030 Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
PLANETE LÉGUMES FLEURS & PLANTES