Bulletin de Santé du Végétal

horticulture & pépinière Grand Est

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

BSV n°15 – 4 novembre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe

DONNÉES MÉTÉO

PRIMEVÈRE DES JARDINS

Stade: Croissance végétative des primevères.

Pucerons: Absents.

Thrips: Absents.

Chenilles défoliatrices: Observées en petit nombre dans les cultures.

Sciarides : Quelques signalements de présence de larves dans les cultures.

POINSETTIAS

Stade: La coloration des bractées s'intensifie.

Aleurodes: Présence faible et localisée, mais poursuite des contrôles pour éviter la présence d'adultes en fin de culture.

NOTES BIODIVERSITÉ

Bioagresseurs	Précisions sur le risque	Evaluation du risque
Pucerons	Absent des cultures de primevères des jardins.	**Faible – A surveiller**
Thrips	Absent des cultures de primevères des jardins.	**Faible – A surveiller**
Chenilles défoliatrices	Quelques cas signalés dans les cultures de primevères des jardins.	**Faible – A surveiller**
Sciarides	Quelques signalements de la présence de larves.	**Faible à Modéré**
Aleurodes	Peu observés dans les cultures de poinsettias.	**Faible - A surveiller**

Le réseau compte **16 parcelles** observées cette semaine.

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

Rapports techniques sur les résistances en France – R4P (r4p-inra.fr)

Prévisions météo à 7 jours pour Nancy :

JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09	MARDI 10	MERCREDI 11
0° / 11°	0° / 10°	3° / 10°	3° / 11°	5° / 12°	8° / 14°	9° / 15°
10 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h

(Source : Météo France, ville de Nancy, 03/11/26 à 18H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

Prévisions météo à 7 jours pour Strasbourg :

JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09	MARDI 10	MERCREDI 11
2° / 11°	2° / 9°	3° / 9°	4° / 10°	5° / 10°	6° / 11°	7° / 13°
5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h

(Source : Météo France, ville de Strasbourg, 03/11/26 à 18H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

Prévisions météo à 7 jours pour Reims :

JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09	MARDI 10	MERCREDI 11
2° / 11°	2° / 9°	3° / 9°	4° / 10°	5° / 10°	6° / 11°	7° / 13°
5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h

(Source : Météo France, ville de Reims, 03/11/26 à 18H. Retrouvez les données météo actualisées ici).

La fin de la semaine est marquée par un abaissement des températures avec des valeurs nocturnes proches des gelées. Puis changement de temps à partir de lundi avec le retour des pluies et des températures qui devraient être au-dessus des normales de saison.



Oothèque de mante religieuse (coque rigide pour protéger les œufs jusqu'au printemps) (E. HUE, Planète LFP)

1 Stade des cultures

Les primevères poursuivent leur enracinement avec une croissance satisfaisante dans les différentes séries.



Serre de *Primula acaulis*
(C. STRACH, Planète LFP)

2 Chenilles défoliatrices

a. Observations

Un observateur signale la présence de trous dans les feuilles et de chenilles défoliatrices dans la culture.



Noctuelle prélevée dans une culture de primevères des jardins et dégâts sur feuilles
(N. BROUHEZ, Planète LFP)

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation répétée de feuilles trouées dans les cultures, le risque est à prendre en compte.

c. Analyse de risque

Les trous dans le feuillage et les boutons floraux grignotés donnent naissance à des fleurs déformées non commercialisables.



d. Gestion alternative du risque

En cas d'observation de plusieurs chenilles, il est encore possible d'utiliser le *Bacillus thuringiensis* comme méthode de lutte. Le *Bacillus* ou « Bt » est une bactérie qui produit des toxines. Consommées par les chenilles, celles-ci attaquent les cellules intestinales provoquant leur mort en quelques jours.

3 Sciarides



Larve de sciaride translucide (ephytia.inra.fr)

a. Observations


La présence de larves de sciaride reste signalée dans les jeunes plants fraichement empotés.

b. Seuil indicatif de risque

Dès l'observation de 1 à 3 larves à proximité du jeune plant, le seuil indicatif de risque pour le végétal est atteint.

c. Analyse de risque

Leur présence est à surveiller, avec l'installation de panneaux jaunes dans les cultures pour piéger les adultes. Les substrats de culture riches en matière organique, humides et chauds sont favorables au développement des larves.



d. Gestion alternative du risque

Des apports de nématodes, *Steinernema feltiae*, 8 à 10 jours après l'empotage permettent d'éliminer les larves de sciaride. La mise en place d'un seau d'élevage d'*Atheta coriaria* est également possible. De plus les staphylins mangent également toutes sortes de larves et de nymphes (dont celle du thrips) qui se trouvent dans les premiers centimètres du substrat.

1 Stade des cultures

Les poinsettias continuent leur développement dans les serres de production. La coloration des bractées en rouge est maintenant bien visible.



Culture de poinsettias avec bractées rouges (C. STRACH. Planète LFP)

2 Aleurodes

a. Observations

Très peu présents dans les cultures.

b. Seuil indicatif de risque

L'installation de panneaux jaunes englués dans les cultures permet de suivre l'évolution des populations d'aleurodes. Dès la capture de quelques adultes sur les panneaux, le seuil indicatif de risque est atteint. En effet, en cas de forte infestation, les piqûres provoquées par les aleurodes ralentissent le développement des plantes.



Aleurodes face inférieure d'une feuille (C. STRACH, Planète LFP)

c. Analyse du risque

A ce stade, le risque reste faible. Néanmoins, il faut suivre l'évolution du nombre d'individus collés sur les panneaux englués.





d. Gestion alternative du risque

B R

L'apport d'acariens prédateurs *Amblyseius montdorensis* qui s'attaquent avec voracité aux œufs et aux larves des aleurodes, ou d'*Amblyseius swirskii* plus polyphage (photo ci-contre) et consommant également des thrips, permet de limiter efficacement les poulations.

Le groupe ALEURODES / CULTURES SOUS SERRE / Pyréthrinoïdes de synthèse est exposé à un risque de résistance.

NOTES BIODIVERSITÉ

Sommaire

Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



























Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Horticulteurs et pépiniéristes volontaires, Conseillers horticoles (Planète Légumes Fleurs et Plantes, Astredhor Est).

Rédaction et animation : Planète Légumes Fleurs et Plantes.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030 Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
PLANETE LÉGUMES FLEURS & PLANTES