

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°10 – 2 septembre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

La maturation des cônes est en cours dans toutes les parcelles.

MALADIES

Mildiou primaire : Aucun symptôme.

Mildiou secondaire : Absence de symptôme.

Oïdium : Attaques sur cônes en variété sensible.

RAVAGEURS

Altises : Attaques sur feuilles.

Pucerons : Absence.

Acariens : Rares individus.

Bombyx antique : Absence.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Le réseau compte **12 parcelles** observées cette semaine, uniquement des parcelles flottantes.



1 Stade du houblon

Le retour de températures plus acceptables a favorisé le développement du houblon, mais le retard accumulé cet été reste d'actualité. Les cônes grandissent encore pour les variétés tardives, alors que l'arôme commence à se développer dans les variétés précoces. La récolte pourrait démarrer d'ici quelques jours, soit avec une bonne semaine de retard par rapport à la normale.



2 Données météo

Prévisions météo à 7 jours pour Obernai :

JEUDI 03	VENDREDI 04	SAMEDI 05	DIMANCHE 06	LUNDI 07	MARDI 08	MERCREDI 09
12° / 29°	14° / 32°	16° / 30°	14° / 32°	17° / 31°	16° / 26°	14° / 21°
▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	► 10 km/h	◀ 5 km/h	▼ 15 km/h	▼ 15 km/h	▼ 5 km/h 45 km/h

(Source Météo France, 01/09/2026 à 12h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Brumath :

JEUDI 03	VENDREDI 04	SAMEDI 05	DIMANCHE 06	LUNDI 07	MARDI 08	MERCREDI 09
11° / 30°	14° / 33°	17° / 29°	14° / 32°	17° / 30°	17° / 25°	13° / 20°
► 20 km/h	► 10 km/h	► 15 km/h	◀ 10 km/h	► 10 km/h 40 km/h	▼ 10 km/h 40 km/h	▼ 20 km/h 45 km/h

(Source Météo France, 01/09/2026 à 12h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Wissembourg :

JEUDI 03	VENDREDI 04	SAMEDI 05	DIMANCHE 06	LUNDI 07	MARDI 08	MERCREDI 09
13° / 29°	15° / 32°	18° / 28°	14° / 31°	17° / 30°	16° / 25°	14° / 21°
▼ 20 km/h 40 km/h	▼ 20 km/h	► 15 km/h	◀ 15 km/h	► 10 km/h 45 km/h	▼ 15 km/h 45 km/h	▼ 20 km/h 45 km/h

(Source Météo France, 01/09/2026 à 12h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))




1 Mildiou primaire

a. Observations

Aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque

La situation est saine depuis plusieurs semaines et ne devrait plus évoluer, d'autant plus que la météo prévisionnelle ne sera pas favorable à la maladie : le risque devrait donc se maintenir à un niveau très faible pour la fin de saison.



c. Gestion alternative du risque

Le risque est accru dans les parcelles touchées par le mildiou l'année dernière. L'élimination des repousses situées sous les ancrages ou au pied des poteaux est une mesure prophylactique efficace permettant d'éliminer un des facteurs de risque. Rappel : la gestion du mildiou primaire est indispensable pour limiter les contaminations secondaires.

2 Mildiou secondaire

a. Observations

Aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque

La présence de pousses spiciformes portant du mycélium sur la face inférieure des feuilles est le premier facteur de risque mildiou secondaire. Une météo douce et pluvieuse est nécessaire ensuite pour permettre la dissémination et la fructification des spores sur feuilles ou sur fleurs.

Depuis le dernier bulletin, quelques averses orageuses ont arrosé les houblonnières de façon très hétérogène. Les précipitations ont été de trop courte durée pour favoriser le mildiou. La météo des 7 prochains jours prévoit un été indien sec plutôt qu'un temps d'automne. Corrélé à l'absence de contaminations primaires, le risque devrait donc rester à un niveau relativement faible.

NB : le calcul de l'indice de risque climatique s'arrête au 31/08.



c. Gestion alternative du risque

L'élimination des pousses spiciformes permet de diminuer le risque de contaminations secondaires sur feuilles.

3 Oïdium

a. Observations

Les premiers cônes touchés par l'oïdium sont observés depuis une dizaine de jour sur variété sensible.


Les symptômes peuvent être frais (photo de gauche : poudrage blanc sur certaines folioles) ou plus anciens (photo de droite : folioles qui prennent un aspect brunâtre).



(CA Alsace les 24 et 31 août)

b. Analyse de risque

Avec de temps à autre un orage, et des nuits « fraîches » permettant à l'hygrométrie de s'élever, le développement de la maladie sur cônes n'est pas une surprise, d'autant plus que des pustules ont été observées sur feuilles durant l'été. Il faut rester vigilant jusqu'à la récolte qui tarde à démarrer (et qui pourra durer jusqu'à début octobre), car la rosée nocturne prévisionnelle (températures inférieures à 15°C, ciel dégagé) pourrait être favorable à la maladie, surtout en variétés sensibles. Avec la présence de symptômes frais, le risque est en augmentation cette semaine.






1 Altises

a. Observations

Des individus et leurs dégâts de nutrition sur feuilles au niveau des rejets sur la butte sont observés dans plusieurs parcelles du réseau cette semaine.

b. Analyse de risque

Les altises ont pu profiter d'une météo qui leur a été très favorable pendant très longtemps (chaud et sec) cet été. La météo des 7 prochains jours devrait encore leur être favorable, le risque se maintient donc à un niveau plutôt élevé et doit inciter les planteurs à une surveillance renforcée des parcelles. Les dégâts ne touchent que les feuilles à ce jour, mais sont possibles également sur cônes, entraînant la dégradation de la récolte si les altises s'attaquent aux cônes.



c. Gestion alternative du risque

Alors que ce ravageur était historiquement cantonné à certains secteurs, les altises sont présentes dans de nombreuses parcelles depuis quelques années. Aucune mesure de lutte préventive n'est connue à ce jour.

2 Pucerons

a. Observations


Aucun puceron n'a été observé cette semaine.

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 50 pucerons en moyenne par feuille.

c. Analyse de risque

Les pucerons sont absents depuis plusieurs semaines. Le risque se maintient donc un niveau très faible.



d. Gestion alternative du risque

Aucune mesure de lutte préventive n'est connue contre les pucerons. En revanche, il est important de signaler le rôle des ennemis naturels des pucerons du houblon. Il existe 2 types d'auxiliaires selon leur régime alimentaire :

- Les parasitoïdes qui, pour se développer, se logent dans l'insecte ravageur, entraînant sa mort.
- Les prédateurs qui, pour survivre, se nourrissent directement des insectes ravageurs (par exemple larves de coccinelles, syrphes ou chrysopes...).

Aucune coccinelle n'a été observée cette semaine dans les parcelles du réseau.


3 Acariens

a. Observations

Quelques rares individus ont été observés, essentiellement en bordure de parcelle exposée au soleil.

b. Analyse de risque

Malgré une météo très ensoleillée cet été, ce ravageur reste très discret. L'augmentation des températures prévue pour cette fin de semaine doit inciter à la surveillance des parcelles, et en priorité les bordures les plus exposées au soleil. Le risque est encore assez faible à ce jour mais pourrait augmenter avec une météo moins sèche.



4 Bombyx antique

a. Observations

Aucun individu n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque

Ce ravageur, présent ponctuellement mais en très faible nombre, peut faire de gros dégâts comme en 2022, où les populations ont explosé très rapidement dans plusieurs parcelles. La surveillance des parcelles doit se poursuivre. Le risque est faible à ce jour mais nécessite une attention particulière.





Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, Lycée Agricole d'Obernai.

Rédaction : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr