

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°1 – 8 avril 2021

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au chapitre



Stade : les premières pousses sont visibles dans certaines parcelles.

Maladies : absentes pour le moment.

Ravageurs : premiers dégâts de charançons.





1 Stade des cultures

Pour ce premier bulletin de l'année, seules quelques parcelles ont pu faire l'objet d'observations. En effet, dans les parcelles taillées récemment, aucune pousse n'est visible actuellement, donc aucune observation n'est possible.

Dans les parcelles taillées plus tôt, courant février, les premières pousses sont visibles et peuvent mesurer jusqu'à 25-30 cm dans certains cas. La hauteur est très variable selon la variété et surtout la date de taille. Les températures très douces de la semaine dernière étaient favorables à la croissance des premières pousses, mais le froid actuel (et les gelées nocturnes) a tendance à complètement bloquer le développement des plantes.



Strisselspalt taillé en février (photo CAA 06/04/21)

2 Maladies

a. Observations

A ce stade, aucune pousse spiciforme (mildiou primaire) n'a été observée en culture.

b. Analyse du risque

Attention, si actuellement le risque est très faible car les pousses sont encore très petites et peu nombreuses, il faudra redoubler de vigilance dès que la croissance redémarrera avec le retour de conditions plus poussantes.

3 Ravageurs : Otiorrhynques de la livèche

a. Observations

La chaleur de la semaine dernière a permis de faire émerger les premières pousses, mais également les premiers charançons ! Le premier individu a été observé le 26 mars, dans une parcelle replantée à l'automne dernier. Dans les parcelles en pleine production où des pousses sont présentes, des dégâts (morsures sur jeunes pousses) ont été observés et signalés la semaine dernière, essentiellement dans des parcelles historiquement touchées par ce ravageur. Par endroit, la pression est forte, et 100 % des pieds sont attaqués.

b. Analyse du risque

Les températures froides actuelles ne sont pas favorables à l'activité du ravageur. Par contre, il faudra rester vigilant dès le retour des conditions météo plus clémentes (soleil, absence de vent, températures douces...).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace – Comptoir Agricole – Lycée Agricole d'Obernai.

Rédaction : Chambre d'Agriculture d'Alsace

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN joliane.carabin@grandest.chambagri.fr