

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°6 –24 juin 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Les stades varient entre « 2/3 fil » et « début floraison ».

MALADIES

Mildiou primaire : La maladie reste présente dans 25 % des parcelles du réseau.

Mildiou secondaire : Absence de symptômes.

Oïdium : Pustules dans certaines parcelles flottantes.

RAVAGEURS

Altises : En régression.

Pucerons : Une évolution très hétérogène.

Acariens : 1 parcelle touchée.

ENQUÊTE NATIONALE BSV

Vous lisez le BSV ? Votre avis compte !

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Le réseau compte **12 parcelles** observées cette semaine.



1 Stade du houblon

Le stade majoritaire de la semaine est le stade $\frac{3}{4}$ fil (BBCH 37). Une seule parcelle du réseau est plus tardive (2/3 fil = BBCH 36). Dans les parcelles plus avancées, le houblon est arrivé au sommet, le bourgeonnement est lancé, et les toutes premières fleurs sont ouvertes (voir photo CA Alsace ci-contre du 23/06/2026).



2 Données météo

Prévisions météo à 7 jours pour Obernai :

JEUDI 25	VENDREDI 26	SAMEDI 27	DIMANCHE 28	LUNDI 29	MARDI 30	MERCREDI 01
22° / 39°	22° / 39°	23° / 39°	23° / 37°	21° / 31°	20° / 28°	18° / 25°
▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 10 km/h	↙ 10 km/h	▲ 5 km/h	▼ 10 km/h	▲ 10 km/h

(Source Météo France, 24/06/2026 à 9h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Brumath :

JEUDI 25	VENDREDI 26	SAMEDI 27	DIMANCHE 28	LUNDI 29	MARDI 30	MERCREDI 01
23° / 40°	22° / 40°	24° / 40°	23° / 37°	22° / 31°	20° / 28°	17° / 25°
▲ 15 km/h	◀ 10 km/h	↻ 5 km/h	↙ 10 km/h	▲ 10 km/h	▼ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source Météo France, 24/06/2026 à 9h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Wissembourg :

JEUDI 25	VENDREDI 26	SAMEDI 27	DIMANCHE 28	LUNDI 29	MARDI 30	MERCREDI 01
23° / 39°	22° / 39°	24° / 40°	24° / 38°	21° / 31°	20° / 28°	18° / 26°
▲ 15 km/h	▼ 5 km/h	▲ 10 km/h	➤ 15 km/h 40 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source Météo France, 24/06/2026 à 9h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))



1 Mildiou primaire

a. Observations

Quelques pousses spiciformes sont signalées dans un quart des parcelles du réseau. La fréquence des attaques reste faible et varie entre 10 et 25 %.

b. Analyse de risque

Le mildiou primaire observé actuellement fait suite aux attaques secondaires de l'année dernière, ou bien rejaillit des souches déjà touchées l'année dernière et qui n'ont pas totalement guéri.

Cette semaine, la situation reste stable mais n'est toujours pas saine alors que la floraison débute timidement !

Les fortes températures en cours depuis quelques jours devraient normalement assainir la situation, en ayant pour effet de sécher les pousses malades. Le risque peut donc être qualifié de plutôt faible, mais la surveillance des parcelles qui ne sont toujours pas saines doit continuer.



c. Gestion alternative du risque

Le risque est accru dans les parcelles touchées par le mildiou l'année dernière. L'élimination des repousses situées sous les ancrages ou au pied des poteaux est une mesure prophylactique efficace permettant d'éliminer un des facteurs de risque. Rappel : la gestion du mildiou primaire est indispensable pour limiter les contaminations secondaires.

2 Mildiou secondaire

a. Observations


Aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque


La présence de pousses spiciformes portant du mycélium sur la face inférieure des feuilles est le premier facteur de risque mildiou secondaire. Une météo douce et pluvieuse est nécessaire ensuite pour permettre la dissémination et la fructification des spores, ce qui n'est pas le cas actuellement. En revanche, la météo annoncée pour le début de la semaine prochaine pourrait devenir plus favorable au développement du mildiou sur feuilles voire sur fleurs.

L'indice de risque climatique devrait donc logiquement augmenter dès ce week-end et à nouveau dépasser le niveau 500. Le niveau de risque devrait donc également augmenter, tout en restant modéré.

Rappel : sur le graphique précédent, le risque climatique est fort lorsque la courbe dépasse la valeur 500 pendant 11 jours consécutifs. A noter que la modélisation n'est applicable que dans les parcelles ou un environnement indemne de contaminations primaires, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des parcelles alsaciennes.



Evolution de l'indice de risque climatique mildiou
(moyenne de 4 postes météo répartis sur l'ensemble de la zone de production du houblon dans le Bas-Rhin).



c. Gestion alternative du risque

L'élimination des pousses spiciformes permet de diminuer le risque de contaminations secondaires sur feuilles.


3 Oïdium

a. Observations

Aucun symptôme observé dans les parcelles du réseau cette semaine, mais des pustules sur feuilles ont été signalées dans 4 parcelles flottantes.

b. Analyse de risque

Les conditions de fortes chaleurs actuelles sont peu favorables au développement de l'oïdium. Mais la tendance orageuse locale des derniers jours peut suffire à maintenir la maladie. Le possible changement de temps à partir de la semaine prochaine, avec des averses ponctuelles et une couverture nuageuse intermittente, pourrait favoriser l'apparition de nouvelles pustules. Le risque « climatique » devrait donc augmenter, tout comme le risque « physiologique », puisque avec l'entrée en floraison, la sensibilité du houblon aux différentes maladies et notamment l'oïdium augmente fortement. Attention donc à ne pas baisser la garde.





1 Altises

a. Observations

Des dégâts ont été signalés dans 2 parcelles cette semaine.

b. Analyse de risque

Peu d'altises ou de dégâts récents ont été observés cette semaine. Le défanage du bas des lianes réalisé dans de nombreuses parcelles réduit mécaniquement les symptômes. Le risque reste donc à un niveau plutôt faible. Mais l'arrivée d'une seconde génération est fort probable dans les prochaines semaines, avec des attaques possibles sur cônes. C'est pourquoi la surveillance des parcelles doit se poursuivre.



c. Gestion alternative du risque

Alors que ce ravageur était historiquement cantonné à certains secteurs, les altises sont présentes dans de nombreuses parcelles depuis quelques années. Aucune mesure de lutte préventive n'est connue à ce jour.

2 Pucerons

a. Observations

Aucun ailé n'est signalé cette semaine. Concernant les individus aptères, le nombre de parcelles attaquées est en retrait avec seulement 60 % des parcelles touchées (contre 100 % dans le dernier bulletin). La fréquence de plantes attaquées est stable, variant de 8 à près de 100 %. Les populations d'aptères sont très variables : on dénombre entre 0,08 et plus de 13 pucerons aptères en moyenne par feuille.

Un fait notable est à souligner : si les populations diminuent dans certaines parcelles, dans d'autres elles ont bien augmenté depuis le dernier bulletin.


b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 50 pucerons en moyenne par feuille.

c. Analyse de risque

Malgré les fortes chaleurs diurnes et les températures élevées la nuit, les pucerons n'ont pas disparu des houblonnières. Et, fait bizarre, malgré une météo théoriquement peu favorable à l'accroissement des populations, le nombre de pucerons augmente dans certaines parcelles.

Le seuil indicatif de risque n'est jamais atteint, mais la surveillance régulière des parcelles doit se poursuivre, en réalisant des comptages sur les feuilles proches du sommet, d'autant plus qu'un changement de météo est annoncé pour la semaine prochaine, et pourrait être plus favorable aux pucerons. Le risque est d'un niveau plutôt faible, mais pourrait évoluer défavorablement.



d. Gestion alternative du risque

Aucune mesure de lutte préventive n'est connue contre les pucerons. En revanche, il est important de signaler le rôle des ennemis naturels des pucerons du houblon. Il existe 2 types d'auxiliaires selon leur régime alimentaire :

- Les parasitoïdes qui, pour se développer, se logent dans l'insecte ravageur, entraînant sa mort.
- Les prédateurs qui, pour survivre, se nourrissent directement des insectes ravageurs (par exemple larves de coccinelles, syrphes ou chrysopes...).

Quelques coccinelles adultes et des larves ont été observées cette semaine dans les parcelles du réseau.



Larve de coccinelle
(CA Alsace, 23/06/2026)


3 Acariens

a. Observations

Quelques individus ont été signalés dans une parcelle du réseau.

b. Analyse de risque

Malgré un temps très ensoleillé, les populations n'ont pas beaucoup évolué. Fait-il trop sec ? Il faudra surveiller les effets du changement de météo annoncé pour le début de la semaine prochaine. La surveillance des parcelles reste d'actualité, en se focalisant dans un premier temps sur les bordures les plus exposées au soleil. Le risque est encore assez faible à ce jour mais pourrait évoluer à la hausse selon l'effet de la météo.





Vous lisez le BSV ? Votre avis compte !

Dans le cadre d'une étude sur le BSV 2.0, le [CST Ecophyto](#), comité indépendant de gouvernance de la stratégie Ecophyto, mène une enquête auprès des lecteurs du BSV pour mieux comprendre les usages, la valeur qu'ils lui accordent et leurs attentes. Les résultats alimenteront l'élaboration de recommandations sur le dispositif.

La réponse à ce questionnaire vous demandera environ 15 minutes :

<https://sondages.inrae.fr/index.php/375212?lang=fr>



INRAE

Sondages Enquêtes Questionnaires

Enquête auprès des utilisatrices et utilisateurs du BSV dans le cadre de l'évaluation du dispositif

Enquête auprès des utilisatrices et utilisateurs du BSV dans le cadre de l'évaluation du dispositif

[Vous utilisez le BSV ? Votre avis compte !](#) Ce questionnaire prendra environ 15 minutes.

Le Comité scientifique et technique de la stratégie Ecophyto (CST Ecophyto), instance de gouvernance indépendante des ministères, mène une étude sur la pertinence du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) pour ses utilisateurs.

Cette enquête a pour objectif de recueillir vos retours d'expérience afin de mieux comprendre vos usages du BSV, la valeur que vous en retirez et vos attentes. Les résultats alimenteront des recommandations sur le dispositif, qui seront intégrées au rapport d'évaluation transmis aux ministères pilotes de la Stratégie Ecophyto 2030 à l'automne 2026.

Modalités pratiques

- Le questionnaire comprend 4 parties et prend environ **15 minutes**.
- Les réponses sont **anonymes**.
- Pour garantir la robustesse statistique des résultats, merci de **répondre jusqu'au bout** : une participation incomplète ne pourra malheureusement pas être exploitée.
- Un **espace d'expression libre** est prévu en fin de questionnaire.
- Vous pourrez également, si vous le souhaitez, nous laisser votre **adresse e-mail pour recevoir les résultats** de l'enquête et le rapport final.

Votre retour est précieux pour cette étude. L'équipe du CST Ecophyto vous remercie chaleureusement du temps que vous y consacrerez !

Il y a 44 questions dans ce questionnaire.

Ce questionnaire est anonyme.

L'enregistrement de vos réponses à ce questionnaire ne contient aucune information permettant de vous identifier, à moins que l'une des questions ne vous le demande explicitement.

Si vous avez utilisé un code pour accéder à ce questionnaire, soyez assuré qu'aucune information concernant ce code ne peut être enregistrée avec vos réponses. Il est géré sur une base séparée où il sera uniquement indiqué que vous avez (ou non) finalisé ce questionnaire. Il n'existe pas de moyen pour faire correspondre votre code à vos réponses sur ce questionnaire.

L'enquête est ouverte jusqu'au 26 juin 2026. Les réponses sont anonymes mais si vous souhaitez recevoir une synthèse des résultats et le rapport final, vous pouvez laisser votre adresse e-mail en fin de questionnaire.

Ce retour sera précieux pour cette étude, l'équipe du CST Ecophyto vous remercie par avance du temps que vous y consacrerez.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, Lycée Agricole d'Obernai.

Rédaction : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr