

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°7 –8 juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Les stades varient entre « 3/4 fil » et « début floraison ».

MALADIES

Mildiou primaire : Absence de symptômes.

Mildiou secondaire : Absence de symptômes.

Oïdium : Présence dans certaines parcelles flottantes.

RAVAGEURS

Altises : Dégâts en augmentation.

Pucerons : Une seule parcelle touchée.

Acariens : En développement.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Le réseau compte **12 parcelles** observées cette semaine, ainsi que des parcelles flottantes.



1 Stade du houblon

Le stade majoritaire de la semaine est le stade début bourgeonnement (BBCH 51), observé sur 50 % des parcelles. Un tiers des parcelles du réseau sont plus tardives (3/4 fil = BBCH 37), et 2 parcelles sont plus avancées et commencent à fleurir (BBCH 61). Les fortes chaleurs de la semaine passée, ainsi que la sécheresse persistante font souffrir le houblon, avec pour conséquence un développement freiné et une évolution très lente des stades. Certains houblons n'atteignent toujours pas le sommet de l'échafaudage, et la floraison semble bloquée. D'autres houblons manifestent leur stress par des jaunissements parfois impressionnants des extrémités de leurs rameaux ou lianes (cf. photo ci-contre du 06/07/2026, CA Alsace).



2 Données météo

Prévisions météo à 7 jours pour Obernai :

JEUDI 09	VENDREDI 10	SAMEDI 11	DIMANCHE 12	LUNDI 13	MARDI 14	MERCREDI 15
17° / 33°	16° / 34°	18° / 35°	18° / 34°	20° / 33°	20° / 32°	19° / 31°
▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 5 km/h	▲ 5 km/h	▲ 10 km/h

(Source Météo France, 07/07/2026 à 21h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Brumath :

JEUDI 09	VENDREDI 10	SAMEDI 11	DIMANCHE 12	LUNDI 13	MARDI 14	MERCREDI 15
16° / 34°	18° / 36°	21° / 35°	20° / 35°	20° / 33°	20° / 33°	19° / 32°
▲ 15 km/h	▲ 20 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 10 km/h

(Source Météo France, 07/07/2026 à 21h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Wissembourg :

JEUDI 09	VENDREDI 10	SAMEDI 11	DIMANCHE 12	LUNDI 13	MARDI 14	MERCREDI 15
16° / 33°	17° / 34°	19° / 36°	19° / 35°	20° / 34°	20° / 33°	19° / 32°
▲ 15 km/h	▲ 20 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source Météo France, 07/07/2026 à 21h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))



1 Mildiou primaire

a. Observations

Aucune pousse spiciforme n'a été observée cette semaine.

b. Analyse de risque

Les fortes températures ont permis d'assainir la situation, il n'y a actuellement plus aucune pousse malade. La poursuite d'un temps très chaud et sec ne devrait pas faire évoluer la situation : le risque se maintient donc à un niveau faible.



c. Gestion alternative du risque

Le risque est accru dans les parcelles touchées par le mildiou l'année dernière. L'élimination des repousses situées sous les ancrages ou au pied des poteaux est une mesure prophylactique efficace permettant d'éliminer un des facteurs de risque. Rappel : la gestion du mildiou primaire est indispensable pour limiter les contaminations secondaires.

2 Mildiou secondaire

a. Observations


Aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque

La présence de pousses spiciformes portant du mycélium sur la face inférieure des feuilles est le premier facteur de risque mildiou secondaire. Une météo douce et pluvieuse est nécessaire ensuite pour permettre la dissémination et la fructification des spores sur feuilles ou sur fleurs.

Depuis le dernier bulletin, le premier épisode de forte chaleur s'est achevé le 28 juin avec des orages ayant apporté des quantités de pluies très variables. L'indice de risque climatique a donc logiquement et très rapidement augmenté, pour s'écrouler ensuite très rapidement avec les conditions anticycloniques actuelles qui devraient durer encore pendant au moins 10 jours.

L'indice de risque climatique devrait donc se maintenir à un niveau très faible si les prévisions météo n'évoluent pas.



Evolution de l'indice de risque climatique mildiou
(moyenne de 4 postes météo répartis sur l'ensemble de la zone de production du houblon dans le Bas-Rhin).

Rappel : sur le graphique ci-dessus, le risque climatique est fort lorsque la courbe dépasse la valeur 500 pendant 11 jours consécutifs. A noter que la modélisation n'est applicable que dans les parcelles ou un environnement indemne de contaminations primaires.

Le niveau de risque devrait donc baisser et se maintenir à un niveau faible.



c. Gestion alternative du risque

L'élimination des pousses spiciformes permet de diminuer le risque de contaminations secondaires sur feuilles.

3 Oïdium


a. Observations

Aucun symptôme observé dans les parcelles du réseau cette semaine, mais des pustules sur feuilles ont été signalées dans plusieurs parcelles flottantes.

b. Analyse de risque

Les conditions anticycloniques actuelles ne sont pas favorables au développement de l'oïdium. Mais le risque orageux local présent ces derniers jours peut suffire à maintenir la maladie.

La longue période chaude et sans pluie annoncée pour les 10 prochains jours devrait faire baisser le niveau de risque « climatique ». En revanche, le début de la floraison entraîne une augmentation de la sensibilité du houblon aux maladies, notamment l'oïdium. Il est donc indispensable de poursuivre la surveillance des parcelles, en particulier les variétés sensibles, ainsi que les parcelles fortement touchées par la maladie en 2025.





1 Altises

a. Observations


Des dégâts sont signalés dans plus de la moitié des parcelles du réseau cette semaine. Dans les parcelles touchées, la fréquence des attaques frôle souvent les 100 %. De nombreux adultes ont été observés cette semaine, et les perforations sont très nombreuses sur le bas des plantes (repousses sur la butte), voire jusqu'à 1.5 m de hauteur.



Altises et leurs dégâts (CA Alsace, le 06/07/2026)

b. Analyse de risque

Une nouvelle génération d'altises semble coloniser les houblonnières, profitant d'une météo qui leur est très favorable (chaud et sec). La poursuite d'un temps très anticyclonique doit inciter les planteurs à une surveillance renforcée des parcelles, d'autant plus que le risque est en augmentation.



c. Gestion alternative du risque

Alors que ce ravageur était historiquement cantonné à certains secteurs, les altises sont présentes dans de nombreuses parcelles depuis quelques années. Aucune mesure de lutte préventive n'est connue à ce jour.

2 Pucerons

a. Observations


Une seule parcelle est attaquée par les pucerons aptères cette semaine, à une fréquence et une intensité très faibles (5 % des plantes avec pucerons et 0,5 puceron en moyenne par feuille). Comme dans le bulletin précédent, aucun ailé n'est signalé cette semaine.

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 50 pucerons en moyenne par feuille.

c. Analyse de risque

Les fortes chaleurs, ainsi que les quelques coccinelles présentes, ont permis un grand nettoyage, et l'élimination quasi-totale des pucerons. La poursuite de fortes chaleurs ne sera pas favorable aux pucerons. Le risque reste donc à un niveau faible.



d. Gestion alternative du risque

Aucune mesure de lutte préventive n'est connue contre les pucerons. En revanche, il est important de signaler le rôle des ennemis naturels des pucerons du houblon. Il existe 2 types d'auxiliaires selon leur régime alimentaire :

- Les parasitoïdes qui, pour se développer, se logent dans l'insecte ravageur, entraînant sa mort.
- Les prédateurs qui, pour survivre, se nourrissent directement des insectes ravageurs (par exemple : larves de coccinelles, syrphes ou chrysopes...).

Aucune coccinelle n'a été observée cette semaine dans les parcelles du réseau.

3 Acariens

a. Observations


Quelques individus ont été signalés dans 2 parcelles du réseau, sur les pieds de bordure.



Acarien sur feuille (à gauche) et en gros plan (à droite) (CA Alsace, le 06/07/2026)

b. Analyse de risque

Le temps très ensoleillé devrait être favorable à ce ravageur et doit inciter à la surveillance des parcelles, en se focalisant dans un premier temps sur les bordures les plus exposées au soleil. Le risque est encore assez faible à ce jour mais pourrait évoluer à la hausse selon l'effet de la météo.





Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, Lycée Agricole d'Obernai.

Rédaction : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr