

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°8 –22 juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Les stades varient entre « 3/4 fil » et « début floraison ».

MALADIES

Mildiou primaire : Quelques très rares symptômes.

Mildiou secondaire : Absence de symptômes.

Oïdium : Quelques pustules dans certaines parcelles flottantes.

RAVAGEURS

Altises : La colonisation des parcelles se poursuit.

Pucerons : Absence.

Acariens : Une seule parcelle touchée.

Bombyx antique : Une chenille signalée.

PARASITE ÉMERGENT

Scarabée japonais : deux captures sur la commune de Strasbourg.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Le réseau compte **12 parcelles** observées cette semaine, ainsi que des parcelles flottantes.



1 Stade du houblon

Les stades ont assez peu évolué depuis le dernier bulletin : la canicule aurait-elle bloqué le développement des plantes ?

Les stades varient toujours entre $\frac{3}{4}$ fil (BBCH 37) et début floraison (BBCH 61), mais le stade majoritaire atteint maintenant « début floraison » (cf. photo ci-contre, CA Alsace du 21/07/2026).



2 Données météo

Prévisions météo à 7 jours pour Obernai :

JEUDI 23	VENDREDI 24	SAMEDI 25	DIMANCHE 26	LUNDI 27	MARDI 28	MERCREDI 29
13° / 26°	11° / 28°	13° / 29°	16° / 26°	17° / 26°	14° / 28°	14° / 29°
► 20 km/h	► 10 km/h	► 5 km/h	► 15 km/h	► 20 km/h 40 km/h	► 15 km/h	► 10 km/h

(Source Météo France, 21/07/2026 à 16h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Brumath :

JEUDI 23	VENDREDI 24	SAMEDI 25	DIMANCHE 26	LUNDI 27	MARDI 28	MERCREDI 29
14° / 27°	11° / 29°	14° / 30°	17° / 26°	17° / 26°	15° / 28°	15° / 29°
► 10 km/h	► 15 km/h	► 10 km/h	► 20 km/h 45 km/h	► 20 km/h 45 km/h	► 10 km/h 40 km/h	► 15 km/h

(Source Météo France, 21/07/2026 à 16h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))

Prévisions météo à 7 jours pour Wissembourg :

JEUDI 23	VENDREDI 24	SAMEDI 25	DIMANCHE 26	LUNDI 27	MARDI 28	MERCREDI 29
12° / 27°	12° / 28°	14° / 31°	17° / 27°	17° / 26°	15° / 29°	16° / 30°
► 10 km/h	► 10 km/h	► 15 km/h	► 20 km/h 50 km/h	► 20 km/h 45 km/h	► 10 km/h 45 km/h	► 15 km/h 40 km/h

(Source Météo France, 21/07/2026 à 16h00. Retrouvez les prévisions actualisées [ici](#))



1 Mildiou primaire

a. Observations

Quelques très rares pousses spiciformes ont été observées cette semaine dans 2 parcelles du réseau.

b. Analyse de risque

Malgré quelques pluies d'orages, la météo globalement sèche et chaude a permis d'assainir la situation, il n'y a actuellement quasiment plus aucune pousse malade. La poursuite d'un temps chaud et vraisemblablement plutôt sec ne devrait pas faire évoluer la situation : le risque se maintient donc à un niveau très faible.



c. Gestion alternative du risque

Le risque est accru dans les parcelles touchées par le mildiou l'année dernière. L'élimination des repousses situées sous les ancrages ou au pied des poteaux est une mesure prophylactique efficace permettant d'éliminer un des facteurs de risque. Rappel : la gestion du mildiou primaire est indispensable pour limiter les contaminations secondaires.

2 Mildiou secondaire

a. Observations


Aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

b. Analyse de risque

La présence de pousses spiciformes portant du mycélium sur la face inférieure des feuilles est le premier facteur de risque mildiou secondaire. Une météo douce et pluvieuse est nécessaire ensuite pour permettre la dissémination et la fructification des spores sur feuilles ou sur fleurs.

Depuis le dernier bulletin, les orages du week-end dernier (avec des pluies très hétérogènes sur l'ensemble de la zone de production du houblon) ont entraîné l'augmentation de l'indice de risque climatique, qui s'est offert un petit pic supérieur à 1 000 pendant 2 jours. Mais cette augmentation n'était que temporaire, car le retour d'une météo douce et sèche cette semaine fera nettement baisser le risque. En revanche, si les prévisions météo pour la fin de semaine se confirment, les averses prévues entraineront à nouveau une remontée de l'indice de risque, mais qui ne serait apparemment que de très courte durée.

Le niveau de risque se maintiendra donc à un niveau assez faible jusqu'à début août au moins.



Evolution de l'indice de risque climatique mildiou
(moyenne de 4 postes météo répartis sur l'ensemble de la zone de production du houblon dans le Bas-Rhin).

Rappel : sur le graphique ci-dessus, le risque climatique est fort lorsque la courbe dépasse la valeur 500 pendant 11 jours consécutifs. A noter que la modélisation n'est applicable que dans les parcelles ou un environnement indemne de contaminations primaires.



c. Gestion alternative du risque

L'élimination des pousses spiciformes permet de diminuer le risque de contaminations secondaires sur feuilles.

3 Oïdium

a. Observations

Aucun symptôme n'est signalé dans les parcelles du réseau cette semaine, mais quelques pustules sur feuilles ont été observées dans plusieurs parcelles flottantes, sur une variété sensible.


b. Analyse de risque



Comptoir Agricole de Hochfelden, le 21/07/2026

Les pustules fraîches observées en fin de semaine dernière et ce début de semaine sur variété sensible ont certainement été favorisées par les épisodes orageux de la semaine dernière. Avec des stades qui ne bougent pas beaucoup, le houblon reste dans sa période de plus grande sensibilité aux maladies, notamment l'oïdium. Quelques jours avec une météo moins lumineuse et orageuse suffisent à faire augmenter le risque.

De plus, le rafraîchissement nocturne actuel entraîne l'augmentation de l'hygrométrie nocturne et permet la formation de rosée : cette rosée peut également favoriser le développement de la maladie. Le risque est donc en augmentation cette semaine.



La surveillance des parcelles reste indispensable, en particulier les variétés sensibles, ainsi que les parcelles fortement touchées par la maladie en 2025.



1 Altises

a. Observations


Des dégâts sont observés dans plus de 90 % des parcelles du réseau cette semaine. Dans les parcelles touchées, la fréquence des attaques peut atteindre 100 %. Des adultes ont encore été observés cette semaine, et les perforations sont très nombreuses sur le bas des plantes (repousses sur la butte ou au sol quand le défanage n'est pas réalisé), voire jusqu'à 1,50 m de hauteur.



Altises et leurs dégâts (CA Alsace le 21/07/2026)

b. Analyse de risque

Il est maintenant établi qu'une nouvelle génération d'altises s'est installée dans les houblonnières, profitant d'une météo qui leur a été très favorable pendant trop longtemps (chaud et sec). La poursuite d'un temps très ensoleillé maintient le risque à un niveau plutôt élevé, et doit inciter les planteurs à une surveillance renforcée des parcelles. Les dégâts ne touchent que les feuilles à ce jour, mais le début de la côneaison fera augmenter le risque de dégradation de la récolte si les altises s'attaquent aux cônes.



c. Gestion alternative du risque

Alors que ce ravageur était historiquement cantonné à certains secteurs, les altises sont présentes dans de nombreuses parcelles depuis quelques années. Aucune mesure de lutte préventive n'est connue à ce jour.

2 Pucerons

a. Observations

Aucun puceron n'a été observé cette semaine.

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est de 50 pucerons en moyenne par feuille.

c. Analyse de risque

Les fortes chaleurs, ainsi que les quelques coccinelles présentes, ont permis un grand nettoyage, et l'élimination des pucerons. La météo à venir ne sera pas favorable aux pucerons. Le risque atteint donc un niveau très faible.



d. Gestion alternative du risque

Aucune mesure de lutte préventive n'est connue contre les pucerons. En revanche, il est important de signaler le rôle des ennemis naturels des pucerons du houblon. Il existe 2 types d'auxiliaires selon leur régime alimentaire :

- Les parasitoïdes qui, pour se développer, se logent dans l'insecte ravageur, entraînant sa mort.
- Les prédateurs qui, pour survivre, se nourrissent directement des insectes ravageurs (par exemple larves de coccinelles, syrphes ou chrysopes...).

Aucune coccinelle n'a été observée cette semaine dans les parcelles du réseau.


3 Acariens

a. Observations

Quelques rares individus ont été signalés dans 1 parcelle du réseau, sur une plante de bordure exposée au sud.

b. Analyse de risque

Le temps très ensoleillé aurait dû être favorable à ce ravageur, qui pourtant reste rare jusqu'à présent, mais doit inciter à la surveillance des parcelles, et en priorité les bordures les plus exposées au soleil. Le risque est encore assez faible à ce jour mais pourrait évoluer rapidement à la hausse avec une météo moins caniculaire.



4 Bombyx antique

a. Observations

Une chenille a été observée dans une parcelle du réseau.

b. Analyse de risque

Ce ravageur, présent ponctuellement mais en très faible nombre, peut faire de gros dégâts comme en 2022, où les populations ont explosé très rapidement dans plusieurs parcelles. Cette découverte doit inciter à la surveillance des parcelles. Le risque est encore assez faible à ce jour mais nécessite une attention particulière.



Chenille de Bombyx antique
(CA Alsace 21/07/2026)





Scarabée japonais : deux captures sur la commune de Strasbourg

Dans le cadre de la surveillance officielle réalisée chaque année par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Grand Est, des pièges visant à détecter la présence du scarabée japonais, *Popillia japonica*, ont été mis en place début juin. **Le 26 juin 2026 un premier spécimen a été capturé dans un piège situé sur la commune de Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Cette première capture a été suivie, quelques jours plus tard, de celle d'un second individu.**

Les conditions dans lesquelles les individus ont été capturés laissent supposer qu'il s'agit d'une interception, c'est-à-dire d'individus « auto-stoppeurs » qui se seraient déplacés via le transport humain (camion, voiture).

La campagne de surveillance 2025 avait été marquée par la détection du scarabée japonais pour la première fois sur le territoire national, dans le Grand Est, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec l'interception de 5 individus isolés, dans des contextes distincts.


Le scarabée japonais est susceptible de s'attaquer à plus de 300 plantes hôtes et d'y occasionner des dégâts importants, notamment sur la vigne, le maïs, les arbres fruitiers, ainsi que de nombreuses autres cultures. Les larves, quant à elles, s'attaquent aux gazons, en particulier ceux des terrains de sport. Ce petit coléoptère est classé comme organisme de quarantaine prioritaire au titre de la réglementation européenne, avec une obligation de surveillance et de lutte, en raison de sa nuisibilité importante.

L'insecte est présent en Italie depuis 2014 et en Suisse depuis 2017.

Un renforcement du piégeage a été immédiatement mis en place et des prospections intensives sont menées par les agents de la DRAAF afin de détecter l'éventuelle présence d'autres individus et ainsi confirmer qu'il s'agit bien d'individus isolés.



Scarabée japonais (*Popillia japonica*)



Caractéristiques et taille du scarabée japonais, comparé à un grain de café (gauche) et une cétoine dorée (droite)

Des **affiches et dépliants** pour faciliter la **reconnaissance** de ce coléoptère sont accessibles [sur le site internet de la DRAAF](#) Grand Est ainsi que toute l'actualité relative à *Popillia japonica*.

La surveillance de ce ravageur émergent repose sur la vigilance de chacun. Toute personne pensant être en présence d'un hanneton japonais doit le signaler au service régional de l'alimentation (DRAAF Grand Est) à l'adresse suivante, en spécifiant comme sujet « signalement Popillia » et si possible accompagné de photos :

santedesvegetaux.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, Lycée Agricole d'Obernai.

Rédaction : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr