

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°23 – 26 août 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

POIRIER

Psylle : Des adultes et larves âgées observés cette semaine.

POMMIER - POIRIER

Tavelure : Stade de sensibilité en cours.

POMMIER

Carpocapse : Une capture cette semaine.

PRUNIER

Rouille : Aucun symptôme observé.

Drosophila suzukii : Captures en cours dans des parcelles de prunier.

TOUS FRUITIERS

Moniliose sur fruits : Rares observations sur les fruits arrivés à maturité, période de sensibilité en cours pour les mirabelles.

NOTES BIODIVERSITÉ

Dernier bulletin de cette campagne

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)

 Parcelles observées cette semaine :

3 Pomme, 2 Poire, 10 Prune.



Prévision météo à 7 jours :

Vigneulles-les-Hattonchâtel (55) :

JEUDI 27



16° / 30°

↙ 15 km/h

VENDREDI 28



17° / 22°

↙ 20 km/h

50 km/h

SAMEDI 29



16° / 23°

↘ 20 km/h

45 km/h

DIMANCHE 30



16° / 24°

↙ 10 km/h

45 km/h

LUNDI 31



17° / 23°

↘ 10 km/h

50 km/h

MARDI 01



14° / 23°

➤ 15 km/h

MERCREDI 02



13° / 23°

↘ 10 km/h

40 km/h

(Source : Météo France, 25/08/2026 à 8h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Gugney (88) :

JEUDI 27



16° / 29°

▲ 20 km/h

VENDREDI 28



17° / 24°

➤ 20 km/h

50 km/h

SAMEDI 29



14° / 21°

↘ 20 km/h

45 km/h

DIMANCHE 30



14° / 23°

↙ 20 km/h

LUNDI 31



15° / 22°

↘ 10 km/h

50 km/h

MARDI 01



12° / 22°

➤ 15 km/h

MERCREDI 02



12° / 21°

↘ 15 km/h

40 km/h

(Source : Météo France, 25/08/2026 à 8h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Lucey (54) :

JEUDI 27



16° / 30°

↙ 15 km/h

VENDREDI 28



17° / 24°

↙ 20 km/h

45 km/h

SAMEDI 29



15° / 23°

↘ 20 km/h

45 km/h

DIMANCHE 30



15° / 24°

↙ 10 km/h

45 km/h

LUNDI 31



16° / 23°

↘ 10 km/h

50 km/h

MARDI 01



13° / 22°

➤ 15 km/h

MERCREDI 02



12° / 23°

↘ 10 km/h

40 km/h

(Source : Météo France, 25/08/2026 à 8h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

1 Psylle du poirier (*Cacopsylla pyri*)

Biologie : voir [BSV n°4](#)

a. Observations

Des adultes ont été repérés sur 12 % des arbres et des larves âgées ont été observées sur 54 % des arbres suivis.


b. Seuil indicatif de risque

Le risque débute avec les premières pontes.

Le seuil indicatif de risque sur l'occupation des pousses par les jeunes larves varie entre 10 et 20 % selon la présence d'auxiliaires (punaise prédatrices, chrysopes...).

c. Analyse de risque

Le risque sur les pontes est toujours en cours. Les températures journalières sont favorables à la reproduction et au développement de tous les stades. Surveillez la présence de pontes dans vos parcelles. Les pontes récentes sont de couleur blanche. Elles évoluent ensuite vers le jaune puis à l'orange lorsqu'elles sont proches de l'éclosion.



d. Gestion alternative du risque

Des coccinelles au stade larvaire et adulte (auxiliaires pour ce ravageur) ont été observées sur la parcelle.



Il existe des produits de biocontrôle sous forme de barrière physique qui limitent le dépôt d'œufs. Vous pouvez les retrouver ici : [Liste des produits de biocontrôle | Ecophytopic](#)

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter les liens ci-dessous :

[Guide Eco-Fruits - Argiles \(kaolinite calcinée\) \(inra.fr\)](#) [Les argiles en arboriculture](#)

Les punaises prédatrices comme les orius sont des auxiliaires efficaces dans la gestion de la lutte contre les psylles. Pensez à favoriser l'aménagement paysager de la parcelle et préservez les auxiliaires dans le choix de vos interventions. Eviter l'excès de vigueur et l'excès de fertilisation azotée qui sont favorables aux insectes piqueurs suceurs comme les psylles.



1 Tavelure

Biologie : voir [BSV n°3](#).

a. Observations

Toutes les parcelles du réseau ont atteint le stade sensible en pomme et en poire.

Des anciennes taches ont été observées sur 16 % des arbres et 1,2 % des fruits d'une parcelle.



Premières taches de tavelure sur feuille de pommier observées en 2025
(FREDON GE)

b. Seuil indicatif de risque

En l'absence de suivi biologique de la maturité des ascospores de tavelure, le début du risque est fixé lorsque les variétés précoces auront atteint le stade sensible (en pommier : stade C (BBCH53) ; en poirier : stade C3 (BBCH54)).


Ce sont les pluies qui permettent la projection des spores de la litière vers les feuilles. La contamination est ensuite possible si les conditions de températures et d'humectation des feuilles sont atteintes. Le risque est évalué selon la présence de tavelure en 2025.

Les feuilles et les fruits sont plus sensibles à la tavelure lorsqu'ils sont jeunes et en pleine croissance. Les risques sont ainsi plus importants au printemps durant les périodes de croissance rapide du feuillage et des fruits.

Prérequis pour une contamination

Le risque de contamination primaire se présente seulement lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

1. **Stade sensible atteint** : Pommier C - C3 (apparition des organes verts) ; Poirier C3 - D
2. **Présence d'ascospores matures** libérés lors des épisodes pluvieux (inoculum dans les feuilles tombées au sol l'année précédente s'il y avait présence de tavelure)
3. **Humectation du feuillage suffisamment longue** pour que les spores puissent germer. La vitesse de germination est dépendante de la température.




Le tableau ci-dessous indique les conditions favorables aux contaminations selon Mills et Laplace.

Température moyenne	7°C	8°C	10°C	11°C	12°C	13°C	15°C	18°C
Durée d'humectation nécessaire à la contamination	18h	17h	14h	13h	12h	11h	9h	8h

En cas de présence de tache dans les parcelles, chaque période humide (pluie ou rosée) est à risque de contamination secondaire. Ces taches se multiplient ensuite sur feuille et sur fruit jusqu'à la récolte, voire post-récolte.

c. Analyse de risque

Les précipitations annoncées pour la semaine prochaine augmentent le risque de contamination.



d. Gestion alternative du risque



Il existe des produits de biocontrôle. Vous pouvez les retrouver dans cette [liste](#).

L'élimination des feuilles en hiver, par aspiration ou par broyage, réduit l'inoculum tavelure et donc l'importance des projections du printemps suivant. Le broyage est à privilégier par rapport à l'enlèvement des feuilles de la parcelle car il maintient la matière organique sur place. Il permet également d'accélérer la décomposition des feuilles. L'efficacité du processus est directement dépendante de la qualité du broyage qui doit être très fin et effectué en conditions sèches. Penser également à éliminer les feuilles prisonnières dans les filets paragrêles.

Pour en savoir plus, consultez la fiche [2 Guide_ecophyto_fruits_fichestechniques \(1\).pdf \(ecophytopic.fr\)](#)

Fiches techniques alternatives et prophylaxie : [Arbo tavelure](#)

Focus sur la sensibilité variétale vis-à-vis de la tavelure du pommier

La sensibilité variétale est un facteur déterminant de la gestion de la maladie.

Plus d'informations sur : <https://ephytia.inra.fr/fr/C/22191/Guide-Eco-Fruits-Contrôle-genétique-Choix-du-matériel-végétal>

Il est possible de classer les variétés selon leur sensibilité vis-à-vis de la tavelure :

Sensibilité moyenne à forte : Gala, Fuji, Braeburn, Golden Delicious, Jonagold, Jonagored, Pink Lady®, Red Delicious, Tentation®, Elstar, Chantecler, RubINETTE, Kanzi, Jazz

Sensibilité faible : Reinettes, Akane, Idared, Belle de Boskoop, Corail® Pinova, Melrose, Delbard Jubilé.

Certaines variétés sont dites **résistantes à la tavelure** grâce au gène majeur Vf (nommé Rvi6 dans la nouvelle nomenclature) : **Florina® Querina, Ariane®, Topaz, Goldrush® Coop38, Choupette® Dalinette, Juliet® Coop43, Story® Inored, Opal, Crimson Crisp® Coop 39, Natyra, Natti, Dalinco.**

Toutefois, des souches de *Venturia inaequalis* capables de contourner cette résistance se sont développées. Certaines variétés comme Ariane sont très sensibles une fois contournées, d'autres conservent une résistance partielle.

Des variétés de pommes à jus et à cidre ont également été sélectionnées pour leur moindre sensibilité aux maladies : Judaine®, Judeline®, Chanteline®, Douce de l'Avent et Fréquinette.

<https://www.jardinsdefrance.org/une-nouvelle-generation-de-varietes-de-pommes-tolerantes-a-la-tavelure/>



Il existe un risque de résistance de la tavelure du pommier vis-à-vis de l'azoxystrobine, du difénocazole, du tébuconazole, du pyriméthanol et du cyprodinil. Pour plus d'information : [Liste des résistances - Plateforme R4P](#)



1 Carpocapse des pommes


Biologie : voir [BSV n°7](#).

a. Observations

Aucun papillon n'a été piégé cette semaine sur les 3 pièges installés.



Perforation de carpocapse des pommes (FREDON Grand Est)



Des dégâts ont été observés sur 3 parcelles du réseau : entre 0 % et 2,8 % des fruits étaient touchés.

b. Seuil indicatif de risque

Suivi de piégeage à phéromone : il existe une proposition de seuil au-delà duquel le nombre de captures est jugé important. Il est évalué à 3 captures par semaine.

Les pontes sont possibles dès le début du vol des femelles matures.


Les conditions climatiques permettant l'accouplement et la ponte sont les suivantes :

- T°C crépusculaire > 15°C. La température optimale de ponte se situe entre 23 et 25°C.
- 60 % < Humidité crépusculaire < 90 %. Optimum : 70 à 75 %.
- Temps calme et non pluvieux.

Les éclosions nécessitent une somme de températures de 90 °jours base 10°C après la ponte. Par exemple, pour une température moyenne journalière de 15°C, il faut 18 jours après la ponte pour l'apparition des larves. Pour une température de 20°C de moyenne, il faudra 9 jours. Si cette somme n'est pas atteinte dans les 20 jours, les œufs avortent.

c. Analyse de risque

Le vol se termine. Les températures crépusculaires sont favorables au risque d'accouplement.



d. Gestion alternative du risque



Il existe des produits de biocontrôle Vous pouvez les retrouver dans la liste ci-dessous : [Liste des produits de biocontrôle](#) | [Ecophytopic](#)

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter les liens ci-dessous :

[Guide Eco-Fruits - Lutte par pulvérisation de micro-organismes \(inra.fr\)](#)

Fiche techniques alternatives et prophylaxie : [Arbo carpo pomme](#)

Focus sur les bonnes pratiques de la confusion sexuelle

- La surface couverte conseillée doit être suffisamment grande et homogène avec un minimum de 3 ha
- Les vergers proches à moins de 500 m doivent également être confusés
- **Le contexte de pression doit être faible**, moins de 1 % de dégâts à la récolte
- **La pose des diffuseurs doit être réalisée avant le début du vol**
- La densité des diffuseurs doit être renforcée sur les bordures (+ 10 à 20 %)
- **La surveillance régulière est indispensable pour contrôler la pression et l'efficacité de la méthode (observation des fruits, piège à phéromones avec capsules surdosée ou mâles + femelles, pose de bandes-pièges)**
- Le stockage des phéromones en enceinte réfrigérée.

Pour plus d'informations sur la méthode de confusion sexuelle, vous pouvez également consulter les liens ci-dessous.

[Guide Eco-Fruits - Confusion sexuelle \(inra.fr\)](#)

[Guide Eco-Fruits - Moyens mis en œuvre \(inra.fr\)](#)



Il existe un risque de résistance du carpocapse des pommes et poires sur pommier et poirier vis-à-vis des tebufénozide, spinosad et certains isolats de virus de la granulose (isolats M, R5 et V15). Pour plus d'information : [Liste des insectes résistants - Plateforme R4P](#)



1 Drosophile aux ailes tachetées (*Drosophila suzukii*)


Retrouvez la fiche de reconnaissance [ici](#).

a. Observations

Le vol est en cours.

Cette semaine, entre 0 et 16 individus ont été piégés dans 3 parcelles de quetsches du réseau.

Pour le moment, aucun dégât lié à ce ravageur n'est à signaler.




b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe aucun seuil indicatif de risque fixé pour ce ravageur.

c. Analyse de risque

Ce ravageur apprécie particulièrement les conditions douces et humides. Les populations s'étant bien développées au printemps, le risque est élevé quand les conditions météorologiques sont favorables à leur développement. C'est essentiellement le niveau d'humidité des parcelles qui fera leur niveau de risque. Le risque est donc en augmentation.



Mesures prophylactiques et techniques alternatives

Tout doit être fait pour éviter la pullulation de l'insecte dans les cultures. La mise en œuvre des mesures prophylactiques est de première importance dans le maintien des populations de *D.suzukii* à un faible niveau. Il est donc recommandé de :

- Maintenir un enherbement bas et aéré afin d'éviter les climats humides très favorables au développement du ravageur.
- Récolter les fruits avant leur sur-maturité.
- **Sortir les écarts de tri de la parcelle et les fruits tombés au sol.** Les éliminer de façon rigoureuse pour éviter toute contamination ou développement de la population. Il est par exemple conseillé de mettre les fruits écartés dans des sacs poubelles ou autres contenants fermés hermétiquement ou encore dans une benne couverte d'une bâche de couleur foncée et laisser quelques jours au soleil (solarisation). Privilégier plusieurs petits contenants à un gros, attendre plusieurs jours avant de ré-ouvrir le contenant. Préférer une ouverture en conditions froides afin d'éviter la sortie des adultes.
- **Réfrigérer la récolte** le plus rapidement possible avec une température basse compatible avec la commercialisation des fruits. Raccourcir au maximum le délai de stockage.

2 Rouille du prunier (*Tranzschelia pruni*)

a. Observations

Aucun symptôme n'a été constaté sur les parcelles du réseau.

b. Analyse de risque

Les contaminations interviennent de la fin du printemps et au début de l'été, et les dégâts ne s'expriment qu'à partir de la fin de l'été. Le risque de nouvelle contamination est donc nul, même si des dégâts peuvent apparaître.



Rouille du prunier (Ephytia)



1 Monilioses des fruits (*Monilia fructicola*, *Monilia laxa*, *Monilia fructigena*)

a. Observations


1 % des mirabelles étaient touchées par la moniliose sur 7 parcelles suivies.

b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe aucun seuil indicatif de risque fixé pour ce pathogène.

c. Analyse de risque

La période de sensibilité des fruits est en cours (grossissement des fruits) mais le risque est faible tant que l'humidité n'augmente pas.



Moniliose sur mirabelles (AREFE)



Il existe un risque de résistance des champignons agents de la moniliose des fruits vis-à-vis du fluopyram, fluxapyroxade, boscalide. Pour plus d'information : [Liste des résistances - Plateforme R4P](#)

d. Gestion alternative du risque

Mesures prophylactiques :

Éliminer les parties attaquées pour diminuer l'inoculum et éviter la sur-maturité des fruits sur l'arbre.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AREFE, Chambre d'Agriculture de la Meuse, Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, FREDON Grand Est, les Producteurs.

Rédaction : FREDON Grand Est et AREFE.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr