Bulletin de Santé du Végétal

Lorraine

grandes cultures

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

12 novembre 2026

BILAN POIS DE PRINTEMPS 2026

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe

Présentation du réseau d'épidémiosurveillance

Évolution des stades en cours de campagne

Bilan sanitaire 2026

Facteurs de risque phytosanitaire


Bilan par bioagresseur (ordre chronologique)

- Thrips
- Sitone du pois
- Puceron vert du pois
- Ascochytose
- Tordeuse du pois

Le réseau 2026 compte **14 parcelles de pois de printemps** observées.

1 Présentation du réseau d'épidémiosurveillance

Localisation des parcelles du réseau 2026



Ce BSV dresse le bilan de l'état sanitaire de la campagne 2026 et cible les principaux bioagresseurs en Lorraine et Barrois. Ce sont 9 organismes qui ont participé au réseau d'observation dans le cadre du BSV, pour un total de 14 parcelles.

2 Évolution des stades en cours de campagne

Les stades sont exprimés en pourcentage de stade atteint sur les parcelles observées chaque semaine.

Stade	N° de semaine												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NONLEV (BBCH 00)		36%											
LEVEE (BBCH 10)		45%	30%	8%									
1F (BBCH 11)		18%	30%										
2F (BBCH 12)			40%	46%	8%								
3F (BBCH 13)				31%	15%								
4F (BBCH 14)				15%	38%	22%							
5F (BBCH 15)					15%	22%							
6F (BBCH 16)					23%	11%	8%						
7F (BBCH 17)						11%	15%						
8F (BBCH 18)						33%	38%	8%					
9F (BBCH 19)							8%	33%	10%				
10F (BBCH 19)							31%	8%	20%				
11F (BBCH 19)								42%	20%				
12F (BBCH 19)								8%	40%	33%			
DEBFLOR (BBCH 61)									10%	58%	9%		
JG2CM										8%	73%	30%	
FINFLOR (BBCH 69)											18%	40%	13%
SLA (BBCH 71)												10%	25%
FSLA (BBCH 79)												20%	50%
MATU_PHYSIO (BBCH 85)													13%

3 Bilan sanitaire 2026

Bioagresseurs	Qualification de la pression 2026	Comparaison avec 2025
Thrips	Nulle	<
Sitone du pois	Moyenne	>
Puceron vert du pois	Faible	>
Ascochytose	Faible	=
Tordeuse du pois	Moyenne	>

4 Facteurs de risque phytosanitaire

Les conditions climatiques pluvieuses en début d'année retardent les semis. Ils sont effectués au cours du mois de mars dès lors que les sols sont suffisamment ressuyés. Les pois de printemps lèvent principalement début avril. La probabilité qu'ils soient soumis à des stress thermiques et hydriques au cours de la floraison était déjà *a priori* plus importante que pour des semis précoces. Au printemps 2026, ce risque se concrétise de façon exhacerbée puisque nous avons connu 2 vagues de chaleur d'une précocité et d'une intensité remarquables. La première vague de chaleur coincide avec l'entrée en floraison des pois de printemps sur la dernière décade de mai. Les températures très élévées écourtent la floraison dans les situations en forte tension hydrique (1 semaine à 10 jours de floraison maximum). La floraison se maintient dans les sols où il demeure de la disponibilité en eau (bonne RU et/ou pluie).
Les conditions extrêmement chaudes et sèches expliquent les performances faibles à moyennes des pois de printemps en 2026. Dans les sols à faible diponibilité en eau, les rendements oscillent entre 10 et 20 q/ha. Dans les sols à bonne réserve utile plus ou moins arrosés, les rendements varient entre 30 et 50 q/ha.
Le contexte sanitaire est relativement sain et n'explique pas les performances de la culture.

5 Bilan par bioagresseur

a. Thrips

Le ravageur n'est jamais observé.

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Thrips	Fréquence	X				<
	Intensité	X				

b. Sitone du pois

Des morsures de sitones sont régulièrement observées dans les parcelles à la mi-avril. Au maximum, 50 % des parcelles dépassent le seuil indicatif de risque fixé à 5 à 10 encoches sur les dernières feuilles.
La pression exercée par le ravageur cette année est un peu plus forte que la campagne précédente sans que les intensités d'attaques soient exceptionnelles. Pour mémoire, moins d'un tiers des parcelles dépassait le seuil indicatif de risque en 2025.

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Sitone du pois	Fréquence			X		>
	Intensité			X		

c. Puceron vert du pois

Au plus fort de l'infestation (fin mai), la présence de pucerons est repérée dans 63 % des parcelles (45 % en 2025). Néanmoins, les niveaux d'infestation sont faibles tout au long du printemps. Ils ne dépasseront quasiment jamais 1 à 10 pucerons par plante, comme en 2025. Le seuil indicatif de risque, variable selon le stade de la culture, n'est jamais atteint.

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Puceron vert	Fréquence			X		>
	Intensité		X			

d. Ascochytose

Les pois sont restés sains tout au long du cycle (pas d'information sur la protection des cultures) comme l'an passé. Des traces de maladie sont signalées ponctuellement sur 2 parcelles du réseau à Arrancy-sur-Crusnes et Reffroy.

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Ascochytose	Fréquence		X			=
	Intensité		X			

e. Tordeuse du pois

Le vol débute à la fin du mois de mai. Au terme de la période de surveillance des cultures, le seuil indicatif de risque fixé pour l'alimentation humaine et la production de semences (100 captures cumulées) est dépassé dans 33 % des situations (36 % en 2025). Le seuil défini pour l'alimentation animale (400 captures cumulées) est atteint sur une parcelle soit dans 11 % des situations (0 % en 2025).

Commune	Dpt	Cumul	S22	S23	S24	S25
LANTÉFONTAINE	54	**120**	18	47	55	
VAL DE BRIEY	54	**73**		33	40	0
XONVILLE	54	**88**	0	30	18	40
ARRANCY-SUR-CRUSNES	55	**496**		111	186	199
DEMANGE-BAUDIGNÉCOURT	55	**285**	72	199	14	
GERCOURT-ET-DRILLANCOURT	55	**23**			3	20
RANCOURT-SUR-ORNAIN	55	**8**	0	5	3	
LIFFOL-LE-GRAND	88	**60**			12	48
POMPIERRE	88	**64**		0		64

Pression 2026		0	1	2	3	Evolution 2025
Tordeuse	Fréquence			X		>
	Intensité			X		

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Alter Agro, Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, la Coopérative Agricole Lorraine, EI Marjollet, EMC2, EstAgri, EPL Agro, FREDON Grand Est, GPB Dieuze-Morhange, Hexagrain, LORCA, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, Terres Inovia, Vivescia.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030 Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
ARVALIS
FREDON GRAND EST
Terres Inovia