



Bulletin de Santé du Végétal

grandes
cultures

Lorraine



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°3 – 25 février 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

COLZA

Stade : Reprise de végétation.

Charançon de la tige du colza : Quelques individus isolés capturés. Le vol n'a pas encore débuté sur le territoire.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

45 Colza.



JEUDI 26	VENDREDI 27	SAMEDI 28	DIMANCHE 01	LUNDI 02	MARDI 03	MERCREDI 04
						
6° / 18°	7° / 19°	8° / 14°	3° / 17°	3° / 17°	7° / 18°	6° / 16°
↙ 15 km/h	↙ 15 km/h	➤ 15 km/h	↙ 15 km/h	▲ 20 km/h	↙ 10 km/h	↙ 15 km/h 40 km/h


(Source : Météo France, ville de Nancy, 24/02/2026 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Stades phénologiques

La reprise de végétation (stade C1 - BBCH 30) reste le stade majoritaire cette semaine, mais la montaison est engagée dans 53 % des parcelles du réseau. Un bilan des dégâts aux cultures (gel, hydromorphie, dégâts d'altise) sera fait dans les prochaines semaines, lorsque la montaison sera enclenchée dans toutes les situations (stade C2 - BBCH31 - et plus).

Répartition des stades du colza



Localisation des parcelles observées



(Terres Inovia)

2 Charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)

Le charançon de la tige du colza est un gros charançon de couleur gris cendré avec le bout des pattes noir. Les piqûres de ponte du charançon de la tige du colza entraînent une désorganisation cellulaire qui déforme la tige, voire engendrent des éclatements. La nuisibilité est d'autant plus importante que les printemps sont secs.

L'arrivée des charançons de la tige du colza est souvent concomitante avec le vol de **charançons de la tige du chou**. Cet autre charançon, avec le bout de pattes roux et une tache blanchâtre dorsale entre le thorax et l'abdomen, est historiquement considéré comme peu nuisible dans des conditions normales de culture. Les colzas peuvent supporter sans dommage un grand nombre de larves de charançons de la tige du chou dans la moelle de la tige. Toutefois, la nuisibilité des larves de charançon de la tige du chou est difficile à appréhender et interroge ces dernières années. Les fortes infestations peuvent impacter les plus petits colzas avec un faible diamètre de tige et les nombreuses piqûres à l'aisselle des feuilles peuvent favoriser l'installation des maladies responsables des pieds secs en fin de cycle. Des références sont en cours d'acquisition dans les conditions actuelles de culture. Aujourd'hui, le risque est géré indirectement par la protection qui vise le charançon de la tige du colza.

Charançon de la tige du CHOU

Ceutorhynchus quadridens



Charançon de la tige du COLZA

Ceutorhynchus napi Gyll.




photos Terres Inovia

a. Observations

Les captures des deux types de charançons restent encore isolées cette semaine. Les charançons de la tige du colza ne sont détectés que sur une parcelle (VAL-D'ORNAIN 55) sur les 45 observées cette semaine.

Ces captures ne constituent pas un début de vol sur le territoire mais incitent à remettre en place les pièges sur végétation si ce n'est pas déjà fait (cf. [BSV n°2 du 18 février 2026](#)).




b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque en Lorraine. On considère qu'il y a un risque dès lors que sa présence est relevée sur la parcelle et après un délai de 8 à 10 jours (nécessaire à la maturation des femelles) du stade C2 à E (boutons séparés) inclus.

c. Analyse de risque

Le vol n'a toujours pas débuté sur la région. Les conditions météorologiques plus douces prévues pour ces prochains jours pourraient être plus favorables au déclenchement du vol ou à un début d'activité en parcelle. Le risque reste faible pour l'instant, même si plus de la moitié des parcelles ont atteint ou dépassé le stade C2 (entre-nœuds visibles).





Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, l'ALPA, Alter Agro, Terres Inovia, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, la Coopérative Agricole Lorraine, El Marjollet, EMC2, EstAgri, EPL Agro, FREDON Grand Est, GPB Dieuze-Morhange, Hexagrain, LORCA, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, Vivescia.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr



« Action de la Stratégie Écophyto 2030 pilotée par les ministères chargés de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. »

