



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°10 – 1^{er} juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Du stade baies à taille de grain de plomb (BBCH 73) au stade de pré-fermeture (BBCH 77).
La majorité des parcelles est au stade baies à taille de pois (BBCH 75).

TORDEUSES

Pas d'évolution, conditions défavorables.

MILDIOU

Parcelles du réseau indemnes et pas de nouveau signalement.

OÏDIUM

Vignoble sain - pas de symptôme.

NOTES BIODIVERSITÉ

NOTE TECHNIQUE RÉSISTANCE

Retrouvez la note technique commune gestion des résistances 2026 [ici](#).

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bioagresseur.

Vous pouvez consulter la liste sur :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>



Le réseau compte **9 parcelles** observées cette semaine.



1 Stade des cultures

Le grossissement des baies est plus ou moins avancé selon le secteur et le cépage, les grappes commencent à pendre. En moyenne, la phénologie est au stade baies à taille de pois BBCH 75. Sur les parcelles les plus précoces, quelques grappes entament la fermeture BBCH 77 et les baies sont plus serrées.



Coulure vigne



Pré-fermeture (BBCH 77)

2 Données météo

Aucune précipitation n'est à prévoir pour cette semaine. Les températures baissent sensiblement.

JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
14° / 26°	15° / 26°	14° / 27°	15° / 26°	15° / 28°	16° / 29°	17° / 28°
► 15 km/h	▼ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 10 km/h

(Source : Météo France, ville de Charmes-la-Côte, 29/06/2026 à 11h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Observations

Aucune capture enregistrée cette semaine.

2 Analyse de risque

Le risque tordeuse est faible à modéré, les conditions ensoleillées restent favorables au vol. Surveillez vos pièges pour connaître la dynamique de vol.



3 Gestion alternative de risque

La faune auxiliaire participe à la régulation des populations de tordeuses. Des parasitoïdes (micro-guêpes) pondent dans les œufs de tordeuses et limitent les émergences de larves. Les chauves-souris, passereaux et certains insectes (araignées, carabes, chrysopes, coccinelles, forficules) se nourrissent des larves. La pose de nichoirs permet l'installation de ces prédateurs.



Ponte de tordeuse sur baie



Perforation sur baie

Des fiches Méthodes Alternatives et Prophylaxie existent et sont disponibles [ici](#).



3 Observations

Le vignoble reste sain et aucun symptôme de mildiou n'a été observé sur feuille ou grappe.

N'hésitez pas à nous contacter si vous observez du mildiou (maxime.tolle@fredon-grandest.fr).



Les symptômes de mildiou à rechercher

4 Analyse de risque

Le risque mildiou est faible pour la semaine à venir étant donné le peu de précipitations annoncé.

Sur les grappes au stade baies à taille de pois BBCH 75, la sensibilité au mildiou diminue très sensiblement.



5 Gestion alternative du risque

L'épamprage est une mesure de prévention pour limiter les premières contaminations.

Des fiches Méthodes Alternatives et Prophylaxie existent et sont disponibles [ici](#).



Le mildiou de la vigne est exposé à un risque de résistance aux strobilurines, triazolopyrimidines, carboxamides (CAA), cyanoacetamideoximes, phenylamides (PA), benzamides, azole sulfonamides.



1 Observations

Aucun symptôme n'est observé sur les parcelles du réseau. N'hésitez pas à nous contacter si vous observez de l'oïdium (maxime.tolle@fredon-grandest.fr).



Les symptômes d'oïdium à rechercher

2 Analyse de risque

Le risque oïdium est faible à cette semaine (temps sec et ensoleillé). La surveillance est primordiale pour repérer rapidement les symptômes sur jeunes baies.



3 Gestion alternative du risque

Des fiches Méthodes Alternatives et Prophylaxie existent et sont disponibles [ici](#).



L'oïdium sur vigne est exposé à un risque de résistance aux aza-naphthalenes (AZN).



Il existe des produits de biocontrôle, dont certains peuvent avoir une efficacité partielle.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture de la Meuse, FREDON Grand Est, Viticulteurs volontaires.

Rédaction et animation : FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr